

商品名 ウパシタ静注透析用200μgシリンジ 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	ウパシカルセトナトリウム水和物キット
英名	Upasita	剤型	キット類
薬価	2824.00	規格	200μg 1mL 1筒
メーカー	三和化学研究所	毒劇区分	(劇)

ウパシタ静注透析用200μgシリンジの効能・効果

血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症

ウパシタ静注透析用200μgシリンジの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴

記載場所 使用上の注意

注意レベル **禁止**

2. 低カルシウム血症

記載場所 使用上の注意

注意レベル **注意**

ウパシタ静注透析用200μgシリンジの副作用等

1. 血清カルシウム濃度8.4mg/dL未満

記載場所 用法・用量

頻度 頻度不明

2. 血清カルシウム濃度7.5mg/dL未満

記載場所 用法・用量

頻度 頻度不明

3. PTHが管理目標値を下回った

記載場所 用法・用量

頻度 頻度不明

4. 低カルシウム血症、QT延長、しびれ、筋痙攣、気分不良、不整脈、血圧低下、痙攣

記載場所 重大な副作用

5. QT延長

記載場所	重大な副作用
頻度	5%未満

6. 嘔吐、便秘、悪心、食欲減退、肝機能異常、筋痙縮、浮動性めまい、パーキンソン病、多汗症、高血圧、シャント血栓症、水晶体混濁、顔面浮腫、口渇

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

7. 低カルシウム血症

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

8. 低カルシウム血症、出生存生存性低下、出生存水晶体混濁、出生存体重低値、無形成骨症、低リン酸血症、飢餓骨症候群、hungry bone syndrome

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

ウパシタ静注透析用200μgシリンジの相互作用

1. 薬剤名等：デノスマブ

発現事象	血清カルシウム濃度が低下
理由・原因	本剤の血中カルシウム低下作用が増強

投与条件	-
指示	注意

2. 薬剤名等：ビスホスホネート系薬剤

発現事象	血清カルシウム濃度が低下
理由・原因	本剤の血中カルシウム低下作用が増強

投与条件	-
指示	注意

3. 薬剤名等：選択的エストロゲン受容体モジュレーター

発現事象	血清カルシウム濃度が低下
理由・原因	本剤の血中カルシウム低下作用が増強

投与条件	-
指示	注意

4. 薬剤名等：カルシトニン

発現事象	血清カルシウム濃度が低下
理由・原因	本剤の血中カルシウム低下作用が増強

投与条件	-
指示	注意

5. 薬剤名等：副腎皮質ホルモン

発現事象	血清カルシウム濃度が低下
理由・原因	本剤の血中カルシウム低下作用が増強

投与条件	-
指示	注意

ウパシタ静注透析用200μgシリンジの配合変化

1. 薬剤名等：他剤

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件 -

指示 禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.