

商品名 ラステットSカプセル25mg 医薬品基本情報

薬効	4240 抗腫瘍性植物成分製剤	一般名	エトポシドカプセル
英名	Lastet S	剤型	カプセル
薬価	418.70	規格	25mg 1カプセル
メーカー	日本化薬	毒劇区分	(劇)

ラステットSカプセル25mgの効能・効果

肺小細胞癌、悪性リンパ腫、子宮頸癌、がん化学療法後に増悪した卵巣癌

ラステットSカプセル25mgの使用制限等

1. 重篤な骨髄抑制、本剤成分又は含有成分で重篤な過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 骨髄抑制<重篤な骨髄抑制は除く>、感染症、水痘、腎機能障害、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ラステットSカプセル25mgの副作用等

1. 白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 骨髄抑制、汎血球減少、出血、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. AST上昇、ALT上昇、ビリルビン上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇、LDH上昇、BUN上昇、クレアチニン上昇、尿蛋白、悪心、嘔吐、食欲不振、口内炎、下痢、腹痛、便秘、過敏症、発疹、脱毛、倦怠感、発熱、血清総蛋白減少	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 紅斑、しびれ、一過性皮質盲、不整脈、血圧低下、ナトリウム異常、クロール異常、カリウム異常、カルシウム異常、顔面潮紅、浮腫、味覚異常	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 皮膚そう痒、皮膚色素沈着、頭痛、心電図異常、頻脈	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

6. 骨髄抑制

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

7. 骨髄抑制、致命的経過、感染症、感染症増悪、出血傾向、出血傾向増悪、急性白血病、前白血病相、骨髄異形成症候群、MDS、致命的全身症状、奇形、催奇形性、胎仔毒性、精巣萎縮、精子形成障害、変異原性、精原細胞に染色体異常

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

ラステットSカプセル25mgの相互作用

1. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤

発現事象	骨髄抑制等を増強
------	----------

投与条件	-
------	---

理由・原因	ともに骨髄抑制作用を有する
-------	---------------

指示	注意
----	----

2. 薬剤名等：放射線照射

発現事象	骨髄抑制等を増強
------	----------

投与条件	-
------	---

理由・原因	ともに骨髄抑制作用を有する
-------	---------------

指示	注意
----	----

