

商品名 ベプシドカプセル25mg 医薬品基本情報

薬効	4240 抗腫瘍性植物成分製剤	一般名	エトポシドカプセル
英名	Vepesid	剤型	カプセル
薬価	517.20	規格	25mg 1カプセル
メーカー	チェプラファーム	毒劇区分	(劇)

ベプシドカプセル25mgの効能・効果

肺小細胞癌、悪性リンパ腫、子宮頸癌、がん化学療法後に増悪した卵巣癌

ベプシドカプセル25mgの使用制限等

1. 重篤な骨髄抑制、本剤成分又は含有成分で重篤な過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 骨髄抑制<重篤な骨髄抑制は除く>、感染症、水痘、腎機能障害、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ベプシドカプセル25mgの副作用等

1. 白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 骨髄抑制、汎血球減少、出血、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. AST上昇、ALT上昇、ビリルビン上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇、LDH上昇、BUN上昇、クレアチニン上昇、尿蛋白、悪心、嘔吐、食欲不振、口内炎、下痢、腹痛、便秘、過敏症、発疹、脱毛、倦怠感、発熱、血清総蛋白減少	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 紅斑、しびれ、一過性皮質盲、不整脈、血圧低下、ナトリウム異常、クロール異常、カリウム異常、カルシウム異常、顔面潮紅、浮腫、味覚異常	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 皮膚そう痒、皮膚色素沈着、頭痛、心電図異常、頻脈	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

6. 骨髄抑制

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

7. 骨髄抑制、致命的経過、感染症、感染症増悪、出血傾向、出血傾向増悪、急性白血病、前白血病相、骨髄異形成症候群、MDS、致命的全身症状、奇形、催奇形性、胎仔毒性、精巣萎縮、精子形成障害、変異原性、精原細胞に染色体異常

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ベプシドカプセル25mgの相互作用

1. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤

発現事象 骨髄抑制等を増強

投与条件 -

理由・原因 ともに骨髄抑制作用を有する

指示 注意

2. 薬剤名等：放射線照射

発現事象 骨髄抑制等を増強

投与条件 -

理由・原因 ともに骨髄抑制作用を有する

指示 注意

