

商品名 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 医薬品基本情報

薬効	4240 抗腫瘍性植物成分製剤	一般名	エトポシド100mg5mL注射液
英名	Etoposide SANDOZ	剤型	注射液
薬価	1301.00	規格	100mg 5mL 1瓶
メーカー	サンド	毒劇区分	(劇)

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」の効能・効果

悪性リンパ腫、急性白血病、睾丸腫瘍、絨毛性疾患、肺小細胞癌、膀胱癌、精巣胚細胞腫瘍、卵巢胚細胞腫瘍、性腺外胚細胞腫瘍、胚細胞腫瘍、小児横紋筋肉腫、小児神経芽腫、小児ユーイング肉腫ファミリー腫瘍、小児肝芽腫、小児肝原発悪性腫瘍、小児腎芽腫、小児腎原発悪性腫瘍、小児網膜芽腫、小児悪性固形腫瘍、腫瘍特異的T細胞輸注療法の前処置

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」の使用制限等

1. 重篤な骨髓抑制、本剤成分又は含有成分で重篤な過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 骨髓抑制<重篤な骨髓抑制は除く>、感染症、水痘、腎機能障害、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」の副作用等

1. 白血球減少、血小板減少、貧血	記載場所	重大な副作用
2. 骨髓抑制、汎血球減少、好中球減少、出血、ショック、アナフィラキシー、チアノーゼ、呼吸困難、胸内苦悶、血圧低下、発熱、咳嗽、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. AST上昇、ALT上昇、ビリルビン上昇、Al-P上昇、LDH上昇、BUN上昇、クレアチニン上昇、尿蛋白、悪心、嘔吐、食欲不振、口内炎、下痢、腹痛、便秘、過敏症、発疹、脱毛、皮膚そう痒、頭痛、頻脈、倦怠感、発熱、血清総蛋白減少	記載場所	その他の副作用
4. しびれ、一過性皮質盲、不整脈、ナトリウム異常、クロール異常、カリウム異常、カルシウム異常、注射部位反応、注射部位発赤、注射部位腫脹、注射部位疼痛、注射部位壊死、注射部位硬結、顔面潮紅、味覚異常	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

5. γ -GTP上昇、紅斑、皮膚色素沈着、心電図異常、血圧低下、浮腫

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

6. 骨髄抑制

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

7. 骨髄抑制、致命的経過、感染症、感染症増悪、出血傾向、出血傾向増悪、急性白血病、前白血病相、骨髄異形成症候群、MDS、肝中心静脈閉塞症、VOD、致命的全身症状、奇形、催奇形性、胎仔毒性、消化器障害、肺障害、中毒症状、あえぎ呼吸、アシドーシス、痙攣、血管痛、静脈炎、硬結、壊死、一過性血圧低下、不整脈、血圧低下、精巣萎縮、精子形成障害、変異原性、精原細胞に染色体異常

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

エトキシド点滴静注液100mg「サンド」の相互作用

1. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤

発現事象 骨髄抑制等を増強

投与条件 -

理由・原因 ともに骨髄抑制作用を有する

指示 注意

2. 薬剤名等：放射線照射

発現事象 骨髄抑制等を増強

投与条件 -

理由・原因 ともに骨髄抑制作用を有する

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』