

商品名 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」 医薬品基本情報

薬効	4240 抗腫瘍性植物成分製剤	一般名	ドセタキセル注射液
英名	Docetaxel TOWA	剤型	注射液
薬価	10166.00	規格	80mg 4mL 1瓶
メーカー	東和薬品	毒劇区分	(毒)

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」の効能・効果

乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭頸部癌、卵巣癌、食道癌、子宮体癌、前立腺癌

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」の使用制限等

1. 重篤な骨髄抑制、感染症、発熱を有し感染症又はその恐れ・疑い、本剤成分又は含有成分で重篤な過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 好中球数が $\geq 2000/\text{mm}^3$ 未満	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 脳転移病巣、骨髄抑制、間質性肺炎、肺線維症、浮腫、アルコールに過敏の既往、腎機能障害、肝機能障害、肝機能異常、血中ビリルビン高値、血中アルカリホスファターゼ高値を伴うトランスアミナーゼ高値	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」の副作用等

1. 骨髄抑制	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 白血球減少、好中球減少、発熱性好中球減少、ヘモグロビン減少、血小板減少	記載場所	重大な副作用

3.	骨髓抑制、汎血球減少、黄疸、肝不全、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいAl-P上昇、重篤な肝障害、肺線維症、放射線肺臓炎、虚血性大腸炎、腹痛、吐血、下血、下痢、イレウス、急性呼吸促進症候群、呼吸障害、急性膵炎、血清アミラーゼ値異常、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、多形紅斑、水疱性皮疹、滲出性皮疹、心タンポナーデ、肺水腫、心筋梗塞、静脈血栓塞栓症、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群、SIADH、低浸透圧血症、低ナトリウム血症、尿中ナトリウム排泄量増加、痙攣、意識障害、重篤な口内炎、粘膜炎、血管炎、末梢神経障害、四肢脱力感、末梢性運動障害、Radiation Recall現象	記載場所	重大な副作用
		頻度	頻度不明
4.	呼吸困難、気管支痙攣、血圧低下、胸部圧迫感、発疹、ショック症状、アナフィラキシー、急性腎障害、重篤な腎障害、間質性肺炎、心不全、播種性血管内凝固症候群、DIC、腸管穿孔、胃腸出血、大腸炎、胸水、腹水、重篤な浮腫、重篤な体液貯留、敗血症、肺炎、感染症、感染症増悪	記載場所	重大な副作用
		頻度	5%未満
5.	食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、口内炎、便潜血、過敏症、アレルギー、発赤、脱毛、皮疹、しびれ感、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇、LDH上昇、蛋白尿、K異常、Na異常、Cl異常、Ca異常、BUN上昇、全身倦怠感、発熱、浮腫、総蛋白異常、アルブミン異常、A/G比異常、CK異常	記載場所	その他の副作用
6.	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道炎、しゃっくり、皮膚剥離、手足症候群、皮膚エリテマトーデス、皮膚強皮症様変化、傾眠、視覚障害、閃光、光のちらつき、暗点、涙道閉塞、黄斑浮腫、筋炎、血痰、脱水	記載場所	その他の副作用
		頻度	頻度不明
7.	腹痛、腹部膨満感、便秘、舌炎、口内乾燥、そう痒感、潮紅、皮膚色素沈着、爪疾患、爪剥離、爪変形、爪変色、爪下出血、爪下血腫、爪下膿瘍、頭痛、意識喪失、見当識障害、めまい、昏迷、難聴、耳鳴、味覚異常、不眠、羞明、視力異常、流涙、結膜炎、筋肉痛、関節痛、筋力低下、脱力感、背部痛、痙攣、総ビリルビン上昇、クレアチニン上昇、尿糖、血尿、乏尿、頻尿、血圧低下、血圧上昇、不整脈、動悸、頻脈、呼吸困難、咽頭炎、咳嗽、静脈炎、疼痛、胸痛、全身痛、熱感、腰痛、鼻出血、ほてり	記載場所	その他の副作用
		頻度	5%未満
8.	間質性肺炎	記載場所	使用上の注意
9.	過敏症状	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
10.	重篤な肝障害	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
11.	重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
12.	播種性血管内凝固症候群、DIC	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明

13.	重篤な骨髄抑制、好中球減少、重症感染症、死亡、致命的、感染症、CRP上昇、発熱、重篤な過敏症状、呼吸困難、気管支痙攣、血圧低下、胸部圧迫感、発疹、心不全、不整脈、動悸、精巣毒性、胚致死作用、胎仔致死作用、胎仔発育遅延、胎仔発達遅延、出生仔発育遅延、出生仔発達遅延、催奇形性、副作用、硬結、壊死、Recall現象、浮腫、重篤な過敏症、アナフィラキシーショック、3kg以上の体重増加を伴う全身性浮腫、脱水症、肺水腫、Grade4の好中球減少、発熱性好中球減少、重篤な血小板減少、重篤な口内炎、皮膚剥離、皮膚症状、死、急性白血病、骨髓異形成症候群、MDS、二次性悪性腫瘍、異数性、小核誘発	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
14.	脱毛	記載場所	使用上の注意
		頻度	5%未満

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーフ」の相互作用

1. 薬剤名等：薬物代謝酵素CYP3A4の活性に影響を及ぼす薬剤

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	本剤は、主として薬物代謝酵素CYP3A4で代謝	指示	注意

2. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤

発現事象	骨髄抑制等の副作用が増強	投与条件	-
理由・原因	共に骨髄抑制作用を有する	指示	注意

3. 薬剤名等：放射線照射

発現事象	肺陰影、放射線肺臓炎	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

4. 薬剤名等：放射線照射

発現事象	骨髄抑制等の副作用が増強	投与条件	-
理由・原因	共に骨髄抑制作用を有する	指示	注意

5. 薬剤名等：アゾール系抗真菌剤

発現事象	副作用が強くあらわれる	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP3A4を阻害又はドセタキセルとの競合により、ドセタキセルの代謝が阻害され、その結果としてドセタキセルの血中濃度が上昇	指示	注意

6. 薬剤名等：エリスロマイシン

発現事象	副作用が強くあらわれる	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP3A4を阻害又はドセタキセルとの競合により、ドセタキセルの代謝が阻害され、その結果としてドセタキセルの血中濃度が上昇	指示	注意

7. 薬剤名等：クラリスロマイシン

発現事象	副作用が強くあらわれる	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP3A4を阻害又はドセタキセルとの競合により、ドセタキセルの代謝が阻害され、その結果としてドセタキセルの血中濃度が上昇	指示	注意

8. 薬剤名等：シクロスポリン

発現事象	副作用が強くあらわれる	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP3A4を阻害又はドセタキセルとの競合により、ドセタキセルの代謝が阻害され、その結果としてドセタキセルの血中濃度が上昇	指示	注意

9. 薬剤名等：ミダゾラム

発現事象	副作用が強くあらわれる	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP3A4を阻害又はドセタキセルとの競合により、ドセタキセルの代謝が阻害され、その結果としてドセタキセルの血中濃度が上昇	指示	注意

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーフ」の配合変化

1. 薬剤名等：他剤

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』