

商品名 カソデックス錠80mg 医薬品基本情報

薬効	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	一般名	ビカルタミド錠
英名	Casodex	剤型	錠
薬価	150.30	規格	80mg 1錠
メーカー	アストラゼネカ	毒劇区分	(劇)

カソデックス錠80mgの効能・効果

前立腺癌

カソデックス錠80mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

カソデックス錠80mgの副作用等

1. 劇症肝炎、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、肝機能障害、黄疸、間質性肺炎、心不全、心筋梗塞	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 白血球減少、血小板減少	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. 乳房腫脹、乳房圧痛、ほてり、勃起力低下、性欲減退	記載場所	その他の副作用
4. 血尿、夜間頻尿、発汗、皮膚乾燥、脱毛、多毛、光線過敏症、頭痛、めまい、不眠、抑うつ状態、食欲不振、下痢、悪心、嘔吐、消化不良、鼓腸放屁、腹痛、骨盤痛、過敏症、血管浮腫、蕁麻疹、貧血、浮腫、倦怠感、無力症、疲労、高血糖、体重増加、体重減少	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、腎機能障害、クレアチニン上昇、BUN上昇、皮膚そう痒、発疹、傾眠、心電図異常、便秘、口渇、胸痛、総コレステロール上昇、中性脂肪上昇、さむけ	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

6. 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

7. 子宮の腫瘍性変化、雄仔の雌性化、前立腺癌以外の死亡、心・循環器系疾患、死亡、心不全、心筋梗塞、脳血管障害、呼吸困難

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

カソデックス錠80mgの相互作用

1. 薬剤名等：クマリン系抗凝血薬

発現事象	作用を増強	投与条件	-
理由・原因	in vitro試験で蛋白結合部位においてワルファリンと置換	指示	慎重投与

2. 薬剤名等：トルブタミド

発現事象	作用を増強	投与条件	-
理由・原因	本剤は、in vitro試験でトルブタミドの代謝を阻害	指示	注意

3. 薬剤名等：デキストロメトर्फアン

発現事象	作用を増強	投与条件	-
理由・原因	本剤は、in vitro試験でデキストロメトर्फアンの代謝を阻害	指示	注意

4. 薬剤名等：CYP3A4によって代謝される薬物

発現事象	作用を増強	投与条件	-
理由・原因	本剤は、in vitro試験でCYP3A4によるテストステロン6β-水酸化酵素活性を阻害	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』