

商品名 ゾリンザカプセル100mg 医薬品基本情報

薬効	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	一般名	ボリノスタットカプセル
英名	Zolanza	剤型	カプセル
薬価	5723.00	規格	100mg 1カプセル
メーカー	M S D	毒劇区分	(劇)

ゾリンザカプセル100mgの効能・効果

皮膚T細胞性リンパ腫

ゾリンザカプセル100mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、重度肝障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 軽度肝障害、中等度肝障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 皮膚以外の病変<内臓等>	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意
4. 静脈血栓塞栓症又はその既往、糖尿病又はその恐れ・疑い、軽度肝障害、中等度肝障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ゾリンザカプセル100mgの副作用等

1. Grade3の毒性、Grade4の毒性、休薬に至った毒性、休薬を必要とする毒性	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 血小板減少症、貧血	記載場所	重大な副作用
3. 腎不全	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

4. 肺塞栓症、深部静脈血栓症、脱水症状、高血糖

記載場所 重大な副作用

頻度 5%未満

5. レンサ球菌性菌血症、好中球減少症、白血球減少症、リンパ球数減少、浮動性めまい、頭痛、錯感覚、嗜眠、失神、高血圧、動悸、呼吸困難、咳嗽、下痢、悪心、口内乾燥、嘔吐、便秘、腹痛、上腹部痛、胃食道逆流性疾患、胃腸出血、ALT増加、AST増加、脱毛症、皮膚剥脱、多汗症、血中クレアチニン増加、蛋白尿、血尿、高マグネシウム血症、低カリウム血症、筋痙縮、味覚異常、疲労、悪寒、食欲不振、体重減少、味覚減退、発熱、胸痛、末梢性浮腫、冷感、血管神経性浮腫

記載場所 その他の副作用

6. 憩室炎、溶血、虚血性脳卒中、低血圧、血管炎、咯血、嚥下障害、肝虚血、高ビリルビン血症、尿閉、低ナトリウム血症、腫瘍出血、霧視、難聴、無力症、高トリグリセリド血症、倦怠感

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

7. 高血糖

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

8. 血小板減少、貧血、腎機能障害

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

9. 脱水症状、黄体数増加、胚致死作用、生存胎仔平均体重減少、骨化遅延、骨格変異、変異原性、染色体異常、小核を有する赤血球

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ゾリンザカプセル100mgの相互作用

1. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

2. 薬剤名等：クマリン系抗凝血剤

発現事象 INR上昇、プロトロンビン時間<PT>延長

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

3. 薬剤名等：バルプロ酸

発現事象 消化管出血・血小板減少・貧血等の副作用が増強

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.