

商品名 ランダ注10mg/20mL 医薬品基本情報

薬効	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	一般名	シスプラチン注射液
英名	Randa	剤型	注射液
薬価	958.00	規格	10mg 20mL 1瓶
メーカー	日本化薬	毒劇区分	(毒)

ランダ注10mg/20mLの効能・効果

胃癌、睾丸腫瘍、骨肉腫、食道癌、腎盂腫瘍、神経芽細胞腫、前立腺癌、胆道癌、尿路上皮癌、非小細胞肺癌、膀胱癌、卵巣癌、小細胞肺癌、尿管腫瘍、悪性胸膜中皮腫、精巣胚細胞腫瘍、卵巢胚細胞腫瘍、性腺外胚細胞腫瘍、子宮頸癌、頭頸部癌、胚細胞腫瘍、小児横紋筋肉腫、小児神経芽腫、小児肝芽腫、小児肝原発悪性腫瘍、悪性骨腫瘍、小児髄芽腫、再発・難治性悪性リンパ腫、子宮体癌<術後化学療法・転移・再発時化学療法>、小児悪性固形腫瘍、尿路上皮癌

ランダ注10mg/20mLの使用制限等

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. 重篤な腎障害、アレルギーで過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 禁止 |
| 2. 骨髄抑制、聴器障害、感染症、水痘、腎障害<重篤な腎障害を除く>、肝機能障害 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 注意 |

ランダ注10mg/20mLの副作用等

- | | | |
|-------------------|------|--------|
| 1. 貧血、白血球減少、血小板減少 | 記載場所 | 重大な副作用 |
|-------------------|------|--------|

<p>2. 急性腎障害、重篤な腎障害、BUN値異常、血清クレアチニン値異常、クレアチニン・クリアランス値異常、血尿、尿蛋白、乏尿、無尿、骨髄抑制、汎血球減少、好中球減少、ショック、チアノーゼ、呼吸困難、胸内苦悶、血圧低下、うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲、視覚障害、脳梗塞、一過性脳虚血発作、血小板減少、溶血性貧血、腎不全、溶血性尿毒症症候群、心筋梗塞、狭心症、異型狭心症、うっ血性心不全、不整脈、心室細動、心停止、心房細動、徐脈、胸痛、失神、息切れ、動悸、心電図異常、クームス陽性の溶血性貧血、発熱、咳嗽、胸部X線異常、間質性肺炎、低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量増加、高張尿、痙攣、意識障害、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群、SIADH、劇症肝炎、肝機能障害、消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔、急性膵炎、血清アミラーゼ値異常、血清リパーゼ値異常、高血糖、糖尿病悪化、昏睡、ケトアシドーシス、横紋筋融解症、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、白質脳症、可逆性後白質脳症症候群、歩行時のふらつき、舌のもつれ、頭痛、錯乱、肺塞栓症、深部静脈血栓症、静脈血栓塞栓症</p>	<p>記載場所 重大な副作用</p> <p>頻度 頻度不明</p>
<p>3. 高音域の聴力低下、難聴、耳鳴</p>	<p>記載場所 重大な副作用</p> <p>頻度 5%未満</p>
<p>4. アナフィラキシー、黄疸</p>	<p>記載場所 重大な副作用</p> <p>頻度 0.1%未満</p>
<p>5. 悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、発疹、末梢神経障害、しびれ、麻痺、頭痛、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、LDH上昇、血清ナトリウム異常、血清カリウム異常、血清クロール異常、血清カルシウム異常、血清マグネシウム異常、脱毛、全身倦怠感、発熱、吃逆</p>	<p>記載場所 その他の副作用</p>
<p>6. 便秘、腹部膨満感、口角炎、過敏症、ほてり、言語障害、味覚異常、意識障害、見当識障害、レールミッテ徴候、ビリルビン上昇、γ-GTP上昇、動悸、頻脈、心電図異常、レイノー様症状、テタニー様症状、血清リン異常、紅斑、注射部位反応、注射部位発赤、注射部位腫脹、注射部位疼痛、注射部位壊死、注射部位硬結、血圧上昇、高尿酸血症、脱水</p>	<p>記載場所 その他の副作用</p> <p>頻度 頻度不明</p>
<p>7. イレウス、腹痛、痙攣、皮膚そう痒、皮膚色素沈着、眩暈、疼痛、全身浮腫、血圧低下、胸痛</p>	<p>記載場所 その他の副作用</p> <p>頻度 5%未満</p>
<p>8. 腎障害、骨髄抑制</p>	<p>記載場所 使用上の注意</p> <p>頻度 頻度不明</p>
<p>9. 高血糖、糖尿病悪化</p>	<p>記載場所 使用上の注意</p> <p>頻度 頻度不明</p>
<p>10. 悪心、嘔吐、食欲不振、消化器症状、感染症、感染症増悪、出血傾向、出血傾向増悪、聴器障害、致命的全身症状、奇形、胎児毒性、催奇形性、胎仔致死率増加、胎仔致死作用、消化器障害、骨髄抑制、肺障害、腎機能障害、血球貪食症候群、好酸球増多、心嚢液貯留、ファンコニー症候群、小脳出血、脳浮腫、てんかん、骨肉腫、非ホジキンリンパ腫、無月経、呼吸窮迫症候群、硬結、壊死、急性白血病、前白血病相、骨髄異形成症候群、MDS、精子濃度の回復は認められなかった、遺伝毒性、肺腺腫、皮膚腫瘍</p>	<p>記載場所 使用上の注意</p> <p>頻度 頻度不明</p>

ランダ注10mg/20mLの相互作用

1. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤

発現事象 骨髄抑制を増強

投与条件 -

理由・原因 骨髄抑制作用を有する

指示 注意

2. 薬剤名等：放射線照射

発現事象 骨髄抑制を増強

投与条件 -

理由・原因 骨髄抑制作用を有する

指示 注意

3. 薬剤名等：胸部への放射線照射

発現事象 嚥下障害、肺臓炎、肺陰影、重篤な皮膚炎、食道炎

投与条件 -

理由・原因 動物試験（マウス）で本剤による放射線感受性増加

指示 注意

4. 薬剤名等：パクリタキセル

発現事象 骨髄抑制が増強

投与条件 本剤をパクリタキセルの前に投与

理由・原因 本剤をパクリタキセルの前に投与した場合、パクリタキセルのクリアランスが低下し、パクリタキセルの血中濃度が上昇

指示 注意

5. 薬剤名等：パクリタキセル

発現事象 末梢神経障害が増強

投与条件 -

理由・原因 末梢神経障害を有する

指示 注意

6. 薬剤名等：アミノグリコシド系抗生物質

発現事象 腎障害及び聴器障害が増強

投与条件 -

理由・原因 腎障害及び聴覚障害を有する

指示 注意

7. 薬剤名等：バンコマイシン

発現事象 腎障害及び聴器障害が増強

投与条件 -

理由・原因 腎障害及び聴覚障害を有する

指示 注意

8. 薬剤名等：フロセミド

発現事象 腎障害及び聴器障害が増強

投与条件 -

理由・原因 腎障害及び聴覚障害を有する

指示 注意

9. 薬剤名等：アムホテリシンB

発現事象	腎障害が増強	投与条件	-
理由・原因	腎障害を有する	指示	注意

10. 薬剤名等：頭蓋内放射線照射

発現事象	聴器障害が増強	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

11. 薬剤名等：ピレタニド

発現事象	聴器障害が増強	投与条件	-
理由・原因	聴覚障害を有する	指示	注意

12. 薬剤名等：フェニトイン

発現事象	血漿中濃度が低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

ランダ注10mg/20mLの配合変化

1. 薬剤名等：アルミニウム

発現事象	沈殿物を形成し活性が低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

2. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	本剤は、錯化合物	指示	禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』