

商品名 サイラムザ点滴静注液100mg 医薬品基本情報

薬効	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	一般名	ラムシルマブ（遺伝子組換え）注射液
英名	Cyramza	剤型	注射液
薬価	76659.00	規格	100mg 10mL 1瓶
メーカー	日本イーライリリー	毒劇区分	(劇)

サイラムザ点滴静注液100mgの効能・効果

治癒切除不能な進行・再発の胃癌、治癒切除不能な進行・再発の結腸癌、治癒切除不能な進行・再発の直腸癌、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、がん化学療法後増悪した血清AFP値400ng/mL以上の切除不能肝細胞癌

サイラムザ点滴静注液100mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で重篤な過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 重度肝障害、肝硬変による著明な腹水、肝腎症候群、肝性脳症を伴う肝硬変、重度肝硬変<Child-Pugh分類B又はC>	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. EGFR遺伝子変異陰性の非小細胞肺癌、マイクロ波凝固療法に適応となる肝細胞癌、肝動脈化学塞栓療法に適応となる肝細胞癌、肝動脈塞栓療法に適応となる肝細胞癌、局所療法に適応となる肝細胞癌、経皮的エタノール注入療法に適応となる肝細胞癌、放射線療法に適応となる肝細胞癌、ラジオ波焼灼療法に適応となる肝細胞癌	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意
4. 手術を予定、手術後、血栓塞栓症又はその既往、高血圧症、腹腔内炎症、消化管炎症、出血素因、凝固系異常、出血、消化管出血、咯血の既往、胸部における腫瘍の主要血管への浸潤、胸部における腫瘍内空洞化、大きな手術の術創が治癒していない	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

サイラムザ点滴静注液100mgの副作用等

1. infusion reaction、グレード1のinfusion reaction、グレード2のinfusion reaction、グレード3のinfusion reaction、グレード4のinfusion reaction、高血圧<症候性のグレード2>、高血圧<グレード3以上>、1日尿蛋白量2g以上、1日尿蛋白量3g以上、ネフローゼ症候群	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明

2.	出血、好中球減少症、白血球減少症、発熱性好中球減少症、蛋白尿、AST上昇、ALT上昇、肝障害、感染症	記載場所	重大な副作用
3.	死亡、重度動脈血栓塞栓症、重度出血、創傷治癒障害、創傷治癒障害による合併症、可逆性後白質脳症症候群、痙攣、頭痛、錯乱、視覚障害、間質性肺疾患、肝性脳症、敗血症、血栓性微小血管症、破碎赤血球を伴う貧血、血小板減少、腎機能障害、大動脈解離、動脈解離	記載場所	重大な副作用
		頻度	頻度不明
4.	心筋梗塞、脳血管障害、動脈血栓塞栓症、肺塞栓症、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー、悪寒、潮紅、低血圧、呼吸困難、気管支痙攣、infusion reaction、消化管穿孔、消化管出血、肺出血、好中球減少症、白血球減少症、発熱性好中球減少症、うっ血性心不全、創傷治癒障害、瘻孔、可逆性後白質脳症症候群、痙攣、頭痛、錯乱、視覚障害、ネフローゼ症候群、間質性肺疾患、肝不全、AST上昇、ALT上昇、肝障害、肝性脳症、肺炎、尿路感染、感染症、敗血症、血栓性微小血管症、破碎赤血球を伴う貧血、血小板減少、腎機能障害	記載場所	重大な副作用
		頻度	5%未満
5.	下痢、高血圧、頭痛、貧血、血小板減少症、口内炎、食欲減退、腹痛、脱毛症、発疹、皮膚乾燥、手掌・足底発赤知覚不全症候群、ざ瘡様皮膚炎、疲労、無力症、末梢性浮腫、発熱、体重減少、粘膜炎症、流涙増加	記載場所	その他の副作用
6.	腸閉塞	記載場所	その他の副作用
		頻度	頻度不明
7.	血小板減少症、腹痛、発声障害、甲状腺機能低下症、低ナトリウム血症、低アルブミン血症、低カリウム血症、発疹、皮膚乾燥、末梢性浮腫、粘膜炎症、血管腫、心電図QT延長、呼吸困難、咳嗽、上気道感染、咽頭炎、低リン酸血症、血中クレアチニン増加、潮紅、関節痛、眼瞼浮腫、顔面浮腫	記載場所	その他の副作用
		頻度	5%未満
8.	高血圧	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
9.	ネフローゼ症候群、蛋白尿	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
10.	好中球減少症、白血球減少症、発熱性好中球減少症	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
11.	心筋梗塞、脳血管障害、重篤な動脈血栓塞栓症、死亡、重度動脈血栓塞栓症、重度消化管出血、重度出血、消化管穿孔、重度infusion reaction、発熱性好中球減少症、肺塞栓症、肺出血、胚死亡、流産、催奇形性、骨端成長板において肥厚、骨端軟骨異形成、糸球体腎炎	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
12.	中和抗体発現	記載場所	使用上の注意
		頻度	5%未満

サイラムザ点滴静注液100mgの相互作用

1. 薬剤名等：パクリタキセル以外の抗悪性腫瘍剤

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件

治癒切除不能な
進行・再発の胃
癌

指示

注意

2. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件

がん化学療法後
に増悪した血
清AFP値
が400ng/mL
以上の切除不能
な肝細胞癌

指示

注意

3. 薬剤名等：抗凝固剤

発現事象 出血

理由・原因 出血リスクを増大

投与条件 -

指示

注意

サイラムザ点滴静注液100mgの配合変化

1. 薬剤名等：ブドウ糖溶液

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件 -

指示

禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』