

商品名 サークリサ点滴静注100mg 医薬品基本情報

薬効	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	一般名	イサツキシマブ（遺伝子組換え）注射液
英名	Sarclisa	剤型	注射液
薬価	60364.00	規格	100mg 5mL 1瓶
メーカー	サノフィ	毒劇区分	(劇)

サークリサ点滴静注100mgの効能・効果

多発性骨髄腫

サークリサ点滴静注100mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

サークリサ点滴静注100mgの副作用等

1. Infusion reaction、Grade2のInfusion reaction、Grade3以上のInfusion reaction、Grade3の好中球減少、Grade4の好中球減少

記載場所	用法・用量
頻度	頻度不明

2. アナフィラキシー、呼吸困難、咳嗽、悪寒、気管支痙攣、鼻閉、高血圧、嘔吐、悪心、Infusion reaction、好中球減少症、血小板減少症、骨髄抑制、肺炎、重篤な感染症

記載場所	重大な副作用
------	--------

3. 発熱性好中球減少症、貧血、リンパ球減少症、敗血症

記載場所	重大な副作用
頻度	5%未満

4. 不眠症、末梢性感覚ニューロパチー、高血圧、呼吸困難、下痢、便秘、悪心、疲労、末梢性浮腫、無力症、白内障、気管支炎、上気道感染

記載場所	その他の副作用
------	---------

5. 咳嗽、嘔吐、背部痛、COVID-19感染

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

6. 抗イサツキシマブ抗体、抗イサツキシマブ中和抗体

記載場所	使用上の注意
------	--------

7. 骨髄抑制

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

8. 免疫系に対する影響、骨に対する影響、胎児に有害な影響、血漿中濃度低下、皮膚有棘細胞癌、乳房血管肉腫、骨髄異形成症候群、二次性悪性腫瘍

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

サークリサ点滴静注100mgの配合変化

1. 薬剤名等：他の薬剤

発現事象	-
------	---

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	禁止
----	----



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』