

商品名 ルタテラ静注 医薬品基本情報

薬効	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	一般名	ルテチウムオキシドトレオチド（177Lu）注射液
英名	Lutathera	剤型	注射液
薬価	2647734.00	規格	7.4GBq25mL 1瓶
メーカー	ノバルティス ファーマ	毒劇区分	(劇)

ルタテラ静注の効能・効果

ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍

ルタテラ静注の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

2. 腎機能障害

記載場所 使用上の注意

注意レベル 注意

ルタテラ静注の副作用等

1. 血小板数減少<Grade2以上>、腎機能障害<クレアチンクリアランスが40mL/min未満>、腎機能障害<Ccrが40mL/min未満>、腎機能障害<ベースラインからCcr40%以上低下・SCr40%以上上昇>、副作用<Grade3以上>

記載場所 用法・用量

頻度 頻度不明

2. 骨髄抑制、リンパ球減少、血小板減少、貧血

記載場所 重大な副作用

3. 急性骨髄性白血病

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

4. 腎機能障害、急性腎不全、血中クレアチニン増加、骨髄異形成症候群

記載場所 重大な副作用

頻度 5%未満

5. 食欲減退、悪心、嘔吐、下痢、腹部膨満、腹痛、頭痛、浮動性めまい、味覚障害、注射部位反応、過敏反応、硬結、腫瘍、疼痛、腫脹、脱毛症、疲労

記載場所 その他の副作用

6. ホルモン分泌異常

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

7. 過敏症、蕁麻疹、紅斑、発疹、心房細動、動悸、心電図QT延長、低血圧、失神、潮紅、血管拡張、ほてり、高血圧、高血圧クリーゼ、血中尿素増加、血尿、頻尿、蛋白尿、尿失禁、白血球尿、肝性脳症、ALP増加、ALT増加、AST増加、血中ビリルビン増加、γ-GTP増加、トランスアミナーゼ上昇、糖尿病、甲状腺機能低下症、グリコヘモグロビン増加、高血糖、低血糖、アシドーシス、低マグネシウム血症、低リン酸血症、脱水、高ナトリウム血症、低ナトリウム血症、血中カリウム減少、胃炎、便秘、腸閉塞、腹部不快感、消化不良、おくび、鼓腸、消化器痛、軟便、口内炎、腹水、膵酵素減少、嗅覚錯誤、蟻走感、嗜眠、錯感覚、不安、幻覚、睡眠障害、胸水、咳嗽、呼吸困難、喀痰増加、口腔咽頭痛、骨痛、関節痛、筋痙攣、筋肉痛、背部痛、側腹部痛、筋骨格痛、頸部痛、四肢痛、筋骨格系胸痛、注入部位血管外漏出、回転性めまい、眼障害、眼脂、結膜出血、結膜炎、気道感染、発熱、無力症、胸部不快感、胸痛、悪寒、インフルエンザ様疾患、倦怠感、末梢性浮腫、口渇、体重減少、皮膚乾燥

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

8. 骨髄抑制

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

9. 腎機能障害

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

10. 骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

11. 胎児発育への影響、胎児遺伝子への影響、二次発癌、遺伝子異常

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ルタテラ静注の相互作用

1. 薬剤名等：ソマトスタチンアナログ製剤

発現事象 本剤の有効性が減弱

投与条件 -

理由・原因 これらの薬剤がソマトスタチン受容体で競合することにより、本剤の腫瘍への集積が低下

指示 注意

