

商品名 オキサトミドDS小児用2%「サワイ」 医薬品基本情報

薬効	4490 その他のアレルギー用薬	一般名	オキサトミド2%シロップ用
英名	Oxatomide	剤型	シロップ用
薬価	6.70	規格	2% 1g
メーカー	沢井製薬	毒劇区分	

オキサトミドDS小児用2%「サワイ」の効能・効果

気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、痒疹

オキサトミドDS小児用2%「サワイ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 長期ステロイド療法、肝機能障害又はその既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

オキサトミドDS小児用2%「サワイ」の副作用等

1. 著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいγ-GTP上昇、著しいビリルビン上昇、著しいAl-P上昇、著しいLDH上昇、肝炎、黄疸、全身倦怠感、食欲不振、発熱、嘔気、嘔吐、ショック、アナフィラキシー、血圧低下、呼吸困難、全身紅潮、咽頭浮腫、喉頭浮腫、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、血小板減少	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 肝機能障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. 女性化乳房、膀胱炎様症状、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、排尿困難、発熱	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 過敏症、発疹、眠気、倦怠感、口渇、嘔気、嘔吐、胃部不快感、下痢、好酸球増多	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

5. 硬直、口周囲硬直、四肢硬直、眼球偏位、後屈頸、攣縮、振戦、錐体外路症状、浮腫、顔面浮腫、手足浮腫、月経障害、乳房痛、頭痛、頭重、めまい、ふらつき、立ちくらみ、しびれ感、便秘、胃痛、腹痛、食欲不振、食欲亢進、にがみ、腹部不快感、口内炎、舌あれ、動悸、ほてり、鼻出血
6. 末梢血中好酸球増加、口蓋裂、合指症、指骨形成不全、催奇形作用、錐体外路症状、頸部硬直、痙攣、意識障害、傾眠、血圧低下、洞性徐脈、縮瞳

記載場所	その他の副作用
頻度	0.1%未満
記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

オキサトミドDS小児用2%「サワイ」の相互作用

1. 薬剤名等：アルコール性飲料

発現事象	眠気・倦怠感等が強くあらわれる
理由・原因	相加的に作用

投与条件	-
指示	注意

2. 薬剤名等：中枢神経抑制剤

発現事象	眠気・倦怠感等が強くあらわれる
理由・原因	相加的に作用

投与条件	-
指示	注意

オキサトミドDS小児用2%「サワイ」の配合変化

1. 薬剤名等：他の液シロップ剤

発現事象	分散性が低下
理由・原因	正確な用量調整が困難

投与条件	-
指示	禁止

