

商品名 プランルカストドライシロップ10%「DK」 医薬品基本情報

薬効	4490 その他のアレルギー用薬	一般名	プランルカスト10%シロップ用
英名	Pranlukast DK	剤型	シロップ用
薬価	22.50	規格	10% 1g
メーカー	大興製薬	毒劇区分	

プランルカストドライシロップ10%「DK」の効能・効果

気管支喘息、アレルギー性鼻炎

プランルカストドライシロップ10%「DK」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 長期ステロイド療法	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

プランルカストドライシロップ10%「DK」の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、血圧低下、意識障害、呼吸困難、発疹、白血球減少、発熱、咽頭痛、全身倦怠感、血小板減少、紫斑、鼻出血、歯肉出血、出血傾向、黄疸、著しいAST上昇、著しいALT上昇、肝機能障害、咳嗽、胸部X線異常、好酸球増加、間質性肺炎、好酸球性肺炎、横紋筋融解症、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、急性腎障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 不眠、しびれ、ふるえ、不安、味覚異常、食欲不振、胸やけ、腹部膨満感、舌炎、舌しびれ、不整脈、頻脈、心房細動、期外収縮、動悸、アルカリホスファターゼ上昇、関節痛、筋肉痛、四肢痛、こわばり、CK上昇、尿量減少、排尿障害、胸部絞扼感、浮腫、脱毛、倦怠感、生理不順、乳房腫脹、乳房硬結、乳房痛、女性化乳房、トリグリセリド上昇、口渇、耳鳴	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 過敏症、発疹、蕁麻疹、眠気、嘔気、嘔吐、下痢、AST上昇、ALT上昇、尿潜血、蛋白尿	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 多形滲出性紅斑、そう痒、めまい、けいれん、興奮、頭痛、胃部不快感、腹痛、便秘、口内炎、潮紅、ビリルビン上昇、頻尿、BUN上昇、出血、発熱、咽喉頭異常感、好酸球増多、尿沈渣陽性	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

5. Churg－Strauss症候群様の血管炎、しびれ、四肢脱力、発熱、関節痛、肺浸潤影、血管炎症状

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

6. うつ病、自殺念慮、自殺、攻撃的行動、精神症状

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

プラシカストドライシロップ10%「DK」の相互作用

1. 薬剤名等：CYP3A4によって代謝される薬剤

発現事象 本剤及びこれらの薬剤の血中濃度が上昇

投与条件 -

理由・原因 本剤はin vitro試験でCYP3A4により代謝され、これらの薬剤の代謝を競合的に阻害

指示 注意

2. 薬剤名等：CYP3A4を阻害する薬剤

発現事象 本剤の血中濃度が上昇

投与条件 -

理由・原因 in vitro、in vivo試験でこれらの薬剤により本剤の代謝が阻害

指示 注意

