

商品名 プランルカストDS10%「タカタ」 医薬品基本情報

薬効	4490 その他のアレルギー用薬	一般名	プランルカスト10%シロップ用
英名	Pranlukast TAKATA	剤型	シロップ用
薬価	22.50	規格	10% 1g
メーカー	高田製薬	毒劇区分	

プランルカストDS10%「タカタ」の効能・効果

気管支喘息、アレルギー性鼻炎

プランルカストDS10%「タカタ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 長期ステロイド療法	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

プランルカストDS10%「タカタ」の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、血圧低下、意識障害、呼吸困難、発疹、白血球減少、発熱、咽頭痛、全身倦怠感、血小板減少、紫斑、鼻出血、歯肉出血、出血傾向、黄疸、著しいAST上昇、著しいALT上昇、肝機能障害、咳嗽、胸部X線異常、好酸球増加、間質性肺炎、好酸球性肺炎、横紋筋融解症、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、急性腎障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 不眠、しびれ、ふるえ、不安、味覚異常、食欲不振、胸やけ、腹部膨満感、舌炎、舌しびれ、不整脈、頻脈、心房細動、期外収縮、動悸、アルカリホスファターゼ上昇、関節痛、筋肉痛、四肢痛、こわばり、CK上昇、尿量減少、排尿障害、胸部絞扼感、浮腫、脱毛、倦怠感、生理不順、乳房腫脹、乳房硬結、乳房痛、女性化乳房、トリグリセリド上昇、口渇、耳鳴	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 過敏症、発疹、蕁麻疹、眠気、嘔気、嘔吐、下痢、AST上昇、ALT上昇、尿潜血、蛋白尿	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 多形滲出性紅斑、そう痒、めまい、けいれん、興奮、頭痛、胃部不快感、腹痛、便秘、口内炎、潮紅、ビリルビン上昇、頻尿、BUN上昇、出血、発熱、咽喉頭異常感、好酸球増多、尿沈渣陽性	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

5. Churg－Strauss症候群様の血管炎、しびれ、四肢脱力、発熱、関節痛、肺浸潤影、血管炎症状

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

6. うつ病、自殺念慮、自殺、攻撃的行動、精神症状

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

プラニルカストDS10%「タカタ」の相互作用

1. 薬剤名等：CYP3A4によって代謝される薬剤

発現事象	本剤及びこれらの薬剤の血中濃度が上昇
理由・原因	本剤はin vitro試験でCYP3A4により代謝され、これらの薬剤の代謝を競合的に阻害

投与条件	-
指示	注意

2. 薬剤名等：CYP3A4を阻害する薬剤

発現事象	本剤の血中濃度が上昇
理由・原因	in vitro、in vivo試験でこれらの薬剤により本剤の代謝が阻害

投与条件	-
指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』