

## 商品名 ブロニカ錠40 医薬品基本情報

|      |                  |      |          |
|------|------------------|------|----------|
| 薬効   | 4490 その他のアレルギー用薬 | 一般名  | セラトロダスト錠 |
| 英名   | Bronica          | 剤型   | 錠        |
| 薬価   | 113.90           | 規格   | 40mg 1錠  |
| メーカー | 武田テバ薬品           | 毒劇区分 |          |

## ブロニカ錠40の効能・効果

気管支喘息

## ブロニカ錠40の使用制限等

1. 長期ステロイド療法、肝機能障害

|       |        |
|-------|--------|
| 記載場所  | 使用上の注意 |
| 注意レベル | 注意     |

## ブロニカ錠40の副作用等

1. 黄疸、AST上昇、ALT上昇、重篤な肝機能障害、劇症肝炎

|      |        |
|------|--------|
| 記載場所 | 重大な副作用 |
| 頻度   | 頻度不明   |

2. 嘔吐、血小板減少、不眠、振戦、めまい、ふらつき、しびれ、ほてり、浮腫

|      |         |
|------|---------|
| 記載場所 | その他の副作用 |
| 頻度   | 頻度不明    |

3. 過敏症、発疹、そう痒、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、LDH上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、悪心、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢、便秘、口渇、味覚異常、貧血、好酸球増多、眠気、頭痛、動悸、倦怠感

|      |         |
|------|---------|
| 記載場所 | その他の副作用 |
| 頻度   | 5%未満    |

4. 鼻出血、皮下出血、出血傾向

|      |         |
|------|---------|
| 記載場所 | その他の副作用 |
| 頻度   | 0.1%未満  |

5. 黄疸、AST上昇、ALT上昇、重篤な肝機能障害、劇症肝炎

|      |        |
|------|--------|
| 記載場所 | 使用上の注意 |
| 頻度   | 頻度不明   |

6. 胎仔心室中隔欠損

|      |        |
|------|--------|
| 記載場所 | 使用上の注意 |
|------|--------|

|    |      |
|----|------|
| 頻度 | 頻度不明 |
|----|------|

## ブロニカ錠40の相互作用

1. 薬剤名等：溶血性貧血が報告されている薬剤

|      |       |
|------|-------|
| 発現事象 | 溶血性貧血 |
|------|-------|

|       |   |
|-------|---|
| 理由・原因 | - |
|-------|---|

|      |   |
|------|---|
| 投与条件 | - |
|------|---|

|    |    |
|----|----|
| 指示 | 注意 |
|----|----|

2. 薬剤名等：アスピリン

|      |                 |
|------|-----------------|
| 発現事象 | 本剤の非結合型濃度が26%上昇 |
|------|-----------------|

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 理由・原因 | 本剤がアスピリンと血漿蛋白結合部位で置換し、遊離型血中濃度が上昇 |
|-------|----------------------------------|

|      |   |
|------|---|
| 投与条件 | - |
|------|---|

|    |    |
|----|----|
| 指示 | 注意 |
|----|----|



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』