

商品名 エバスチン錠10mg「ケミファ」 医薬品基本情報

薬効	4490 その他のアレルギー用薬	一般名	エバスチン10mg錠
英名	Ebastine	剤型	錠
薬価	21.90	規格	10mg 1錠
メーカー	日本ケミファ	毒劇区分	

エバスチン錠10mg「ケミファ」の効能・効果

蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、アレルギー性鼻炎

エバスチン錠10mg「ケミファ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 長期ステロイド療法、肝機能障害又はその既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

エバスチン錠10mg「ケミファ」の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、血圧低下、呼吸困難、喉頭浮腫、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇、ALP上昇、ビリルビン上昇、肝機能障害、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、発疹、浮腫、じん麻疹、血圧上昇、不眠、嘔気、嘔吐、腹痛、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇、ALP上昇、ビリルビン上昇、排尿障害、頻尿、好酸球増多、体重増加、月経異常、脱毛、味覚異常、BUN上昇、尿糖	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 眠気、倦怠感、口渇、胃部不快感、鼻腔内乾燥、口腔内乾燥、胸部圧迫感	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 動悸、頭痛、めまい、しびれ感、下痢、舌炎、ほてり	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

エバスチン錠10mg「ケミファ」の相互作用

1. 薬剤名等：エリスロマイシン

発現事象 本剤の代謝物カレバステンの血漿中濃度が約2倍に上昇

投与条件 -

理由・原因 カレバステンの代謝が抑制

指示 注意

2. 薬剤名等：イトラコナゾール

発現事象 本剤の代謝物カレバステンの血漿中濃度が上昇

投与条件 -

理由・原因 カレバステンの代謝が抑制

指示 注意

3. 薬剤名等：リファンピシン

発現事象 本剤の代謝物カレバステンの血漿中濃度が低下

投与条件 -

理由・原因 カレバステンの代謝が促進

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』