

商品名 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」 医薬品基本情報

薬効	4490 その他のアレルギー用薬	一般名	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg錠
英名	Olopatadine hydrochloride JG	剤型	錠
薬価	10.40	規格	2.5mg 1錠
メーカー	日本ジェネリック	毒劇区分	

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」の効能・効果

アレルギー性鼻炎、じん麻疹、(湿疹・皮膚炎、尋常性乾癬、皮膚そう痒症、痒疹、多形滲出性紅斑、皮膚疾患)のそう痒、アレルギー性鼻炎、じん麻疹、(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、皮膚疾患)のそう痒

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 長期ステロイド療法、腎機能低下、クレアチニンクリアランス30mL/min未満、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」の副作用等

1. 劇症肝炎、AST上昇、ALT上昇、 γ -GTP上昇、LDH上昇、Al-P上昇、肝機能障害、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 眠気	記載場所	その他の副作用
3. 不随意運動、顔面不随意運動、四肢不随意運動、嘔吐、月経異常、筋肉痛、関節痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 過敏症、紅斑、発疹、倦怠感、口渇、頭痛、頭重感、めまい、腹部不快感、腹痛、下痢、嘔気、肝機能異常、ALT上昇、AST上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇、Al-P上昇、総ビリルビン上昇、白血球増多、好酸球増多、リンパ球減少、尿潜血、血清コレステロール上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

5. 浮腫、顔面浮腫、四肢浮腫、そう痒、呼吸困難、集中力低下、しびれ感、便秘、口内炎、口角炎、舌痛、胸やけ、食欲亢進、白血球減少、血小板減少、BUN上昇、尿蛋白陽性、血中クレアチニン上昇、頻尿、排尿困難、動悸、血圧上昇、尿糖陽性、胸部不快感、味覚異常、体重増加、ほてり

記載場所	その他の副作用
------	---------

頻度	0.1%未満
----	--------

6. 出生仔体重増加抑制、心筋梗塞

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.