

商品名 サイバインコ錠100mg 医薬品基本情報

薬効	4490 その他のアレルギー用薬	一般名	アブロンチニブ錠
英名	Cibinqo	剤型	錠
薬価	4287.40	規格	100mg 1錠
メーカー	ファイザー	毒劇区分	(劇)

サイバインコ錠100mgの効能・効果

アトピー性皮膚炎

サイバインコ錠100mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、敗血症、重篤な感染症、活動性結核、重度肝機能障害<Child Pugh分類C>、好中球数が $1000/\text{mm}^3$ 未満、リンパ球数が $500/\text{mm}^3$ 未満、ヘモグロビン値が $8\text{g}/\text{dL}$ 未満、血小板数が $50000/\text{mm}^3$ 未満	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 中等度腎機能障害、 $30\text{mL}/\text{分}/1.73\text{m}^2 \leq \text{eGFR} < 60\text{mL}/\text{分}/1.73\text{m}^2$ 、重度腎機能障害、 $\text{eGFR} < 30\text{mL}/\text{分}/1.73\text{m}^2$	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. 中等度腎機能障害、重度腎機能障害、 $\text{eGFR} < 30\text{mL}/\text{分}/1.73\text{m}^2$ 、 $30\text{mL}/\text{分}/1.73\text{m}^2 \leq \text{eGFR} < 60\text{mL}/\text{分}/1.73\text{m}^2$ 、強いCYP2C19阻害薬と併用	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
4. 結核の既往、結核又はその恐れ・疑い、皮膚バリア機能が低下しているアトピー性皮膚炎、感染症<重篤な感染症を除く>又はその恐れ・疑い、胸部レントゲン上結核治癒所見、肺外結核の既往、胸部画像検査で陳旧性結核又はその恐れ・疑い、結核既感染又はその恐れ・疑い、結核患者との濃厚接触歴、B型肝炎の既往、B型肝炎ウイルスキャリア、HBs抗原陰性かつHBc抗体陽性、HBs抗原陰性かつHBs抗体陽性、C型肝炎、HCV RNA陽性、HCV抗体陽性、易感染性、静脈血栓塞栓症のリスクを有する、好中球減少<好中球数 $1000/\text{mm}^3$ 未満を除く>、リンパ球減少<リンパ球数 $500/\text{mm}^3$ 未満を除く>、ヘモグロビン値減少<ヘモグロビン値 $8\text{g}/\text{dL}$ 未満を除く>、血小板減少<血小板数 $50000/\text{mm}^3$ 未満を除く>、間質性肺炎の既往、腸管憩室、心血管系事象のリスク因子を有する関節リウマチ	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

サイバインコ錠100mgの副作用等

1. 結核、重篤な感染症、致死の経過、敗血症、日和見感染、血小板数が50000/mm3未満、ヘモグロビン値が8g/dL未満、リンパ球数が500/mm3未満、好中球数が1000/mm3未満、肝機能障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 消化管穿孔	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 間質性肺炎、発熱、咳嗽、呼吸困難、呼吸器症状	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
4. 口腔ヘルペス、単純ヘルペス、眼部単純ヘルペス、ヘルペス眼感染、ヘルペス性皮膚炎、鼻ヘルペス、带状疱疹、眼带状疱疹、肺炎、血小板減少、ヘモグロビン減少、貧血、リンパ球減少、好中球減少、ALT上昇、AST上昇	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
5. 肺塞栓症、深部静脈血栓症、静脈血栓塞栓症	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
6. 悪心	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
7. 腹痛、嘔吐、下痢、消化不良、腹部不快感、胃食道逆流性疾患、腹部膨満、疲労、無力症、発熱、上咽頭炎、上気道感染、毛包炎、尿路感染、結膜炎、ヘルペス性状湿疹、膿痂疹、インフルエンザ、咽頭炎、副鼻腔炎、気管支炎、膀胱炎、せつ、膿瘍、皮膚感染、胃腸炎、下気道感染、感染性湿疹、皮膚真菌感染、白血球減少、リンパ節症、赤血球減少、白血球増加、高血圧、咳嗽、鼻出血、動悸、心室内伝導障害、頭痛、浮動性めまい、傾眠、体重増加、高脂血症、脂質異常症、ざ瘡、脱毛症、蕁麻疹、皮膚そう痒症、皮膚乳頭腫、疣贅、血中CK増加、NK細胞減少、LDH増加、γ-GT上昇、尿中蛋白陽性、プロトロンビン時間延長	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
8. 結核	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. B型肝炎ウイルス再活性化	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
10. 好中球減少、リンパ球減少、ヘモグロビン減少、血小板減少	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
11. 総コレステロール上昇、LDLコレステロール上昇、HDLコレステロール上昇、トリグリセリド上昇、脂質検査値異常	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

12.	結核、肺炎、敗血症、ウイルス感染、重篤な感染症、重篤な感染症悪化、悪性腫瘍、真菌感染症、日和見感染症、致死の感染症、播種性結核、粟粒結核、肺外結核、脊椎結核、リンパ節結核、活動性結核、感染症、感染症増悪、皮膚感染症、重篤な皮膚感染症、ヘルペスウイルス再活性化、ウイルス再活性化、带状疱疹、単純ヘルペス、重篤な带状疱疹、播種性带状疱疹、悪性リンパ腫、固形癌、肝機能障害、トランスアミナーゼ値上昇、深部静脈血栓症、肺塞栓症、消化管穿孔、妊娠率低下、黄体数減少、着床数減少、着床後胚損失率上昇、受胎能への影響、胎仔毒性、出生後生存率低下、出生仔体重低下、リンパ球減少、血小板減少、主要な心血管系事象、Major Adverse Cardiovascular Events、MACE、悪性腫瘍＜非黒色腫皮膚癌を除く＞、良性胸腺腫、リンパ球数減少、赤血球数減少	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
13.	重篤な感染症、悪性腫瘍＜非黒色腫皮膚癌を除く＞	記載場所	使用上の注意
		頻度	5%未満

サイバインコ錠100mgの相互作用

1. 薬剤名等：適応疾患の生物製剤

発現事象	感染症のリスクが増加	投与条件	-
理由・原因	免疫抑制作用が増強、併用経験はない	指示	禁止

2. 薬剤名等：経口JAK阻害剤

発現事象	感染症のリスクが増加	投与条件	-
理由・原因	免疫抑制作用が増強、併用経験はない	指示	禁止

3. 薬剤名等：免疫抑制剤

発現事象	感染症のリスクが増加	投与条件	-
理由・原因	免疫抑制作用が増強、併用経験はない	指示	禁止

4. 薬剤名等：生ワクチン

発現事象	感染症	投与条件	本剤開始直前及び投与中
理由・原因	リスクを否定できない	指示	禁止

5. 薬剤名等：強いCYP2C19阻害薬と併用

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

6. 薬剤名等：CYP2C19の強い阻害薬

発現事象	本剤の作用が増強	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP2C19の代謝活性を阻害するため、アプロシチニブの血中濃度が上昇	指示	注意

7. 薬剤名等：CYP2C19の強い誘導薬

発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP2C19及びCYP2C9の代謝活性を誘導するため、アプロシチニブの血中濃度が低下	指示	注意

8. 薬剤名等：CYP2C19の中程度の誘導薬

発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP2C19及びCYP2C9の代謝活性を誘導するため、アプロシチニブの血中濃度が低下	指示	注意

9. 薬剤名等：CYP2C9の強い誘導薬

発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP2C19及びCYP2C9の代謝活性を誘導するため、アプロシチニブの血中濃度が低下	指示	注意

10. 薬剤名等：CYP2C9の中程度の誘導薬

発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤がCYP2C19及びCYP2C9の代謝活性を誘導するため、アプロシチニブの血中濃度が低下	指示	注意

11. 薬剤名等：P-gpの基質となる薬剤

発現事象	作用が増強	投与条件	-
理由・原因	本剤がP-gpを阻害することにより、これらの薬剤の血漿中濃度が上昇	指示	注意

12. 薬剤名等：クロピドグレル

発現事象	作用が減弱	投与条件	-
理由・原因	本剤がCYP2C19を阻害することにより、クロピドグレルの活性代謝物の血中濃度が低下	指示	注意

