

商品名 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」1,000JAU/mL 医薬品基本情報

薬効	4490 その他のアレルギー用薬	一般名	アレルゲンエキス（4）注射液
英名	Allergen extract	剤型	注射液
薬価	4186.00	規格	2mL 1瓶
メーカー	鳥居薬品	毒劇区分	

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」1,000JAU/mLの効能・効果

(アレルギー性鼻炎、気管支喘息)の減感作療法

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」1,000JAU/mLの使用制限等

1. 急性感染症、喘息発作時、気管支喘息の症状が激しい、アレルギー症状が激しい、体調が悪い	記載場所	効能・効果
	注意レベル	禁止
2. 重症気管支喘息	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
3. 類薬でアナフィラキシーの既往歴、類薬でアレルギーの既往歴、類薬でショックの既往歴、本剤成分又は含有成分でアナフィラキシーの既往歴、本剤成分又は含有成分でアレルギーの既往歴、本剤成分又は含有成分でショックの既往歴、自己免疫疾患、悪性腫瘍、免疫不全症、免疫系に影響を及ぼす全身性疾患、免疫複合体疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	相対禁止
4. 減感作療法薬との併用、非選択的 β 遮断薬投与中、三環系抗うつ薬投与中、モノアミンオキシダーゼ阻害薬<MAOI>投与中、高血圧症、肺疾患、重症心疾患、全身性ステロイド薬投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」1,000JAU/mLの副作用等

1. アナフィラキシー	記載場所	重大な副作用
2. ショック、血圧低下、呼吸困難、全身潮紅、顔面浮腫、咽頭浮腫、血管浮腫、蕁麻疹、喘息、口腔内異常感、皮膚そう痒感、紅斑、皮膚発赤、胃痛、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢、視覚異常、視野狭窄、鼻閉塞感、くしゃみ、嗄声、咽喉頭そう痒感、咽喉頭異常感、胸部絞扼感、息苦しさ、咳嗽、喘鳴、チアノーゼ、頭痛、耳鳴、不快感、悪寒、四肢のしびれ、顔のしびれ、顔面潮紅、発汗、めまい感、振戦、蒼白、動悸、頻脈、不整脈、不安、恐怖感、意識混濁	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

3. 疼痛、そう痒感、腫脹、紅斑、注射部位反応、熱感、咳嗽、蕁麻疹	記載場所	その他の副作用
4. 硬結、不快感、喘息、呼吸困難、喘鳴、眼充血、耳そう痒症、鼻漏、くしゃみ、咽喉刺激感、口腔咽頭不快感、紅斑、皮膚そう痒症、足底紅斑、悪心、嘔吐、頭痛、感覚障害、潮紅、リンパ節腫脹、倦怠感、末梢性浮腫、発熱	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. 全身性アレルギー反応、アレルギー反応に基づく副作用、ショック、アナフィラキシー、アレルギー反応、反応<アレルギー反応>が強くあらわれる、アドレナリンの効果が増強、副作用がより重篤、著しい刺激、著しい腫脹	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」1,000JAU/mLの相互作用

1. 薬剤名等：減感作療法薬との併用			
発現事象	アナフィラキシー、アレルギー反応	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意
2. 薬剤名等：非選択的β遮断薬投与中			
発現事象	反応<アレルギー反応>が強くあらわれる	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意
3. 薬剤名等：全身性ステロイド薬投与中			
発現事象	本剤の効果が得られない	投与条件	-
理由・原因	免疫系が抑制	指示	注意

