

商品名 ステミラック注 医薬品基本情報

薬効	4900 その他の組織細胞機能用医薬品	一般名	ヒト（自己）骨髄由来間葉系幹細胞
英名	?	剤型	その他
薬価	15234750.00	規格	1回分
メーカー	ニプロ	毒劇区分	

ステミラック注の効能・効果

外傷性脊髄損傷の(神経症候、機能障害)の改善

ステミラック注の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 担癌	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	相対禁止
3. 凝固能亢進、感染症、癌の既往、貧血、血圧を収縮期140mmHg・拡張期90mmHg以下にコントロール出来ない、アレルギーを起こし易い体質、骨粗鬆症、脊髄腫瘍、重度脊髄疾患、重度脊椎疾患、脊髄空洞症、脊髄血管奇形、解離性大動脈瘤、強い動脈硬化性変化、主要血管の高度狭窄、重度石灰化、重度頭蓋内病変、全身状態が極めて不良、循環器疾患、多臓器障害、消化器系疾患、呼吸器系疾患、重度多発性外傷、内分泌代謝疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
4. 抗凝固剤治療、抗血小板剤治療	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意

ステミラック注の副作用等

1. 塞栓症、血栓、血管内溶血	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 貧血、穿刺部位疼痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

3. 肺塞栓、血栓、呼吸状態悪化、バイタルサイン異常

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

4. 貧血、貧血増悪、出血、極度の貧血、極度の低血圧、腸骨骨髓炎、敗血症性ショック、アナフィラキシー、過敏症状、アレルギー反応、異所性組織

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ステミラック注の相互作用

1. 薬剤名等：弱毒生ワクチン

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 本品が免疫調節作用を持つ

指示 慎重投与

2. 薬剤名等：免疫抑制剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 本品が免疫調節作用を持つ

指示 慎重投与

3. 薬剤名等：抗凝固剤治療

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

4. 薬剤名等：抗血小板剤治療

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

