

商品名 オースギ安中散料エキス錠 医薬品基本情報

| | | | |
|------|--------------------------------------|------|---------|
| 薬効 | 5200 漢方製剤 | 一般名 | 安中散エキス錠 |
| 英名 | OHSUGI anchusanryo extract T tablets | 剤型 | 錠 |
| 薬価 | 5.90 | 規格 | 1錠 |
| メーカー | 高砂薬業 | 毒劇区分 | |

オースギ安中散料エキス錠の効能・効果

胃アトニー、慢性胃炎、神経性胃炎

オースギ安中散料エキス錠の副作用等

| | | |
|--|------|---------|
| 1. 低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム貯留、体液貯留、浮腫、体重増加、偽アルドステロン症 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 2. 低カリウム血症、ミオパチー、脱力感、四肢痙攣、四肢麻痺 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 3. 過敏症、発疹、発赤、そう痒 | 記載場所 | その他の副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |

オースギ安中散料エキス錠の相互作用

| | | |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. 薬剤名等：カンゾウ含有製剤 | 投与条件 | - |
| 発現事象 | 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー | |
| 理由・原因 | グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進 | 指示 注意 |
| 2. 薬剤名等：グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 | 投与条件 | - |
| 発現事象 | 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー | |
| 理由・原因 | グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進 | 指示 注意 |



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.