

商品名 オースギ荊芥連翹湯エキスG 医薬品基本情報

薬効	5200 漢方製剤	一般名	荊芥連翹湯エキス顆粒
英名	OHSUGI keigairengyoto extract G	剤型	顆粒
薬価	7.70	規格	1g
メーカー	大杉製薬	毒劇区分	

オースギ荊芥連翹湯エキスGの効能・効果

慢性鼻炎、にきび、慢性扁桃炎、ちくのう症

オースギ荊芥連翹湯エキスGの使用制限等

- 著しく胃腸虚弱、悪心、嘔吐、食欲不振

記載場所	使用上の注意
注意レベル	注意

オースギ荊芥連翹湯エキスGの副作用等

- 間質性肺炎、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音異常

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

- 低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム貯留、体液貯留、浮腫、体重増加、偽アルドステロン症

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

- 低カリウム血症、ミオパチー、脱力感、四肢痙攣、四肢麻痺、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいAl-P上昇、著しいγ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

- 腸間膜静脈硬化症、繰り返し腹痛、繰り返し下痢、繰り返し便秘、繰り返し腹部膨満、便潜血陽性

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

- 過敏症、発疹、そう痒、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

6. 大腸の色調異常、大腸浮腫、大腸びらん、大腸潰瘍、大腸狭窄、腸間膜静脈硬化症

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

7. 食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

オースギ荊芥連翹湯エキスGの相互作用

1. 薬剤名等：カンゾウ含有製剤

発現事象 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー

投与条件 -

理由・原因 グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進

指示 注意

2. 薬剤名等：グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤

発現事象 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー

投与条件 -

理由・原因 グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』