

## 商品名 ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用） 医薬品基本情報

|      |                                                     |      |           |
|------|-----------------------------------------------------|------|-----------|
| 薬効   | 5200 漢方製剤                                           | 一般名  | 炙甘草湯エキス顆粒 |
| 英名   | TSUMURA shakanzoto extract granules for ethical use | 剤型   | 顆粒        |
| 薬価   | 29.40                                               | 規格   | 1g        |
| メーカー | ツムラ                                                 | 毒劇区分 |           |

### ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）の効能・効果

息切れ、動悸

### ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）の使用制限等

|                           |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| 1. アルドステロン症、ミオパチー、低カリウム血症 | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                           | 注意レベル | 禁止     |
| 2. 著しく胃腸虚弱、悪心、嘔吐、食欲不振     | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                           | 注意レベル | 注意     |

### ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）の副作用等

|                                                |      |         |
|------------------------------------------------|------|---------|
| 1. 低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム貯留、体液貯留、浮腫、体重増加、偽アルドステロン症 | 記載場所 | 重大な副作用  |
|                                                | 頻度   | 頻度不明    |
| 2. 低カリウム血症、ミオパチー、脱力感、四肢痙攣、四肢麻痺                 | 記載場所 | 重大な副作用  |
|                                                | 頻度   | 頻度不明    |
| 3. 過敏症、発疹、発赤、そう痒、蕁麻疹、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢       | 記載場所 | その他の副作用 |
|                                                | 頻度   | 頻度不明    |
| 4. 食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢                         | 記載場所 | 使用上の注意  |
|                                                | 頻度   | 頻度不明    |

## ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）の相互作用

### 1. 薬剤名等：カンゾウ含有製剤

|       |                                                  |      |    |
|-------|--------------------------------------------------|------|----|
| 発現事象  | 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー                          | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進 | 指示   | 注意 |

### 2. 薬剤名等：グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤

|       |                                                  |      |    |
|-------|--------------------------------------------------|------|----|
| 発現事象  | 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー                          | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進 | 指示   | 注意 |

### 3. 薬剤名等：ループ系利尿剤

|       |                                                  |      |    |
|-------|--------------------------------------------------|------|----|
| 発現事象  | 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー                          | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進 | 指示   | 注意 |

### 4. 薬剤名等：チアジド系利尿剤

|       |                                                  |      |    |
|-------|--------------------------------------------------|------|----|
| 発現事象  | 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー                          | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進 | 指示   | 注意 |



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』