

商品名 テイコク小柴胡湯エキス顆粒 医薬品基本情報

薬効	5200 漢方製剤	一般名	小柴胡湯エキス顆粒
英名	TEIKOKU shosaikoto extract granules	剤型	顆粒
薬価	14.50	規格	1g
メーカー	帝國漢方製薬	毒劇区分	

テイコク小柴胡湯エキス顆粒の効能・効果

慢性胃腸障害、感冒、気管支炎、気管支喘息、リンパ腺炎、肺炎、産後回復不全、諸種の急性熱性病、慢性肝炎の肝機能障害の改善

テイコク小柴胡湯エキス顆粒の使用制限等

1. インターフェロン製剤投与中、肝癌、肝硬変、慢性肝炎における肝機能障害で血小板数が10万/mm ³ 以下	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 慢性肝炎における肝機能障害で血小板数が15万/mm ³ 以下	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与

テイコク小柴胡湯エキス顆粒の副作用等

1. 間質性肺炎、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音異常、捻髪音	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム貯留、体液貯留、浮腫、体重増加、偽アルドステロン症	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 低カリウム血症、ミオパシー、横紋筋融解症、脱力感、筋力低下、筋肉痛、四肢痙攣、四肢麻痺、CK上昇、CPK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、著しいAST上昇、著しいGOT上昇、著しいALT上昇、著しいGPT上昇、著しいAl-P上昇、著しいγ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
4. 過敏症、発疹、そう痒、蕁麻疹、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、便秘、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

5. 間質性肺炎、死亡、重篤な転帰、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音異常、捻髪音、胸部X線異常	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
6. 血小板数減少	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 異常	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

テイコク小柴胡湯エキス顆粒の相互作用

1. 薬剤名等：インターフェロン製剤			
発現事象	間質性肺炎	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止
2. 薬剤名等：カンゾウ含有製剤			
発現事象	低カリウム血症、ミオパシー、偽アルドステロン症	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸及び利尿剤は、尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意
3. 薬剤名等：グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤			
発現事象	低カリウム血症、ミオパシー、偽アルドステロン症	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸及び利尿剤は、尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意
4. 薬剤名等：ループ系利尿剤			
発現事象	低カリウム血症、ミオパシー、偽アルドステロン症	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸及び利尿剤は、尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意
5. 薬剤名等：チアジド系利尿剤			
発現事象	低カリウム血症、ミオパシー、偽アルドステロン症	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸及び利尿剤は、尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.