

商品名 オースギ川きゅう茶調散料エキスTG 医薬品基本情報

薬効	5200 漢方製剤	一般名	川きゅう茶調散エキス顆粒
英名	OHSUGI senkyuchachosanryo extract TG	剤型	顆粒
薬価	10.80	規格	1g
メーカー	大杉製薬	毒劇区分	

オースギ川きゅう茶調散料エキスTGの効能・効果

かぜ、血の道症、頭痛

オースギ川きゅう茶調散料エキスTGの使用制限等

- 著しく胃腸虚弱、悪心、嘔吐、食欲不振

記載場所	使用上の注意
------	--------

注意レベル	注意
-------	----

オースギ川きゅう茶調散料エキスTGの副作用等

- 低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム貯留、体液貯留、浮腫、体重増加、偽アルドステロン症

記載場所	重大な副作用
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

- 低カリウム血症、ミオパチー、脱力感、四肢痙攣、四肢麻痺

記載場所	重大な副作用
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

- 食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢

記載場所	その他の副作用
------	---------

頻度	頻度不明
----	------

- 食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

オースギ川きゅう茶調散料エキスTGの相互作用

- 薬剤名等：カンゾウ含有製剤

発現事象	低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意

2. 薬剤名等：グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤

発現事象	低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』