

商品名 テイコク桃核承気湯エキス顆粒 医薬品基本情報

薬効	5200 漢方製剤	一般名	桃核承気湯エキス顆粒
英名	TEIKOKU tokakujokito extract granules	剤型	顆粒
薬価	6.80	規格	1g
メーカー	帝國漢方製薬	毒劇区分	

テイコク桃核承気湯エキス顆粒の効能・効果

月経困難症、月経不順、月経時の精神不安、産後の精神不安、便秘、腰痛、高血圧の随伴症状、高血圧の肩こり、高血圧の頭痛、高血圧の眩暈

テイコク桃核承気湯エキス顆粒の使用制限等

1. 下痢、軟便、著しく胃腸虚弱	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
2. 食塩制限	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

テイコク桃核承気湯エキス顆粒の副作用等

1. 低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム貯留、体液貯留、浮腫、体重増加、偽アルドステロン症	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 低カリウム血症、ミオパシー、脱力感、四肢痙攣、四肢麻痺	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 過敏症、発疹、発赤、そう痒、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 異常	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

5. 食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢、流早産

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

テイコク桃核承気湯エキス顆粒の相互作用

1. 薬剤名等：カンゾウ含有製剤

発現事象 低カリウム血症、ミオパシー、偽アルドステロン症

投与条件 -

理由・原因 グリチルリチン酸は、尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進

指示 注意

2. 薬剤名等：グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤

発現事象 低カリウム血症、ミオパシー、偽アルドステロン症

投与条件 -

理由・原因 グリチルリチン酸は、尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』