

商品名 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」 医薬品基本情報

薬効	6113 バンコマイシン製剤	一般名	バンコマイシン塩酸塩静注用
英名	Vancomycin hydrochloride VTRS	剤型	静注用
薬価	1505.00	規格	1g 1瓶
メーカー	ヴィアトリス・ヘルスケア	毒劇区分	

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」の効能・効果

感染性心内膜炎、敗血症、(外傷、熱傷、手術創)の二次感染、化膿性髄膜炎、関節炎、骨髓炎、膿胸、肺炎、肺膿瘍、腹膜炎、
感染性心内膜炎、敗血症、(外傷、熱傷、手術創)の二次感染、化膿性髄膜炎、関節炎、骨髓炎、腹膜炎、化膿性髄膜炎、肺炎、
敗血症、発熱性好中球減少症

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 類薬で過敏症の既往歴、類薬で難聴の既往歴、本剤成分又は含有成分で難聴の既往歴、難聴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 腎機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
4. 腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
5. ブドウ球菌性腸炎	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意
6. 肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」の副作用等

1. red neck症候群、red man症候群、顔紅斑性充血、頸紅斑性充血、 軀幹紅斑性充血、顔そう痒、頸そう痒、軀幹そう痒、血圧低下	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 聴覚障害	記載場所	効能・効果
	頻度	頻度不明
3. ショック、アナフィラキシー、呼吸困難、全身潮紅、浮腫、急性腎障害、間質性腎炎、重篤な腎障害、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens－Johnson症候群、剥脱性皮膚炎、薬剤性過敏症症候群、発疹、発熱、肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現、遅発性の重篤な過敏症状、ヒトヘルペスウイルス6再活性化、HHV－6再活性化、ウイルス再活性化、眩暈、耳鳴、聴力低下、難聴、第8脳神経障害、偽膜性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢、AST上昇、ALT上昇、Al－P上昇、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
4. 過敏症、そう痒、蕁麻疹、線状IgA水疱症、γ－GTP上昇、LAP上昇、貧血、嘔気、嘔吐、腹痛、皮膚血管炎、悪寒、注射部疼痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 発疹、発赤、顔面潮紅、AST上昇、ALT上昇、ビリルビン上昇、Al－P上昇、LDH上昇、BUN上昇、クレアチニン上昇、白血球減少、血小板減少、好酸球増多、下痢、発熱、静脈炎、血管痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. 重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 第8脳神経障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 肝機能障害、黄疸	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 血栓性静脈炎、壊死、心停止	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」の相互作用

- 薬剤名等：腎毒性及び聴器毒性を有する薬剤

発現事象	腎障害・聴覚障害が発現・悪化
------	----------------

理由・原因	両剤共に腎毒性、聴器毒性を有する
-------	------------------

投与条件	-
------	---

指示	原則禁止
----	------

- 薬剤名等：腎毒性を有する薬剤

発現事象	腎障害が発現・悪化	投与条件	-
理由・原因	両剤共に腎毒性を有する	指示	原則禁止

3. 薬剤名等：全身麻酔薬

発現事象	アナフィラキシー反応、ヒスタミン様潮紅、紅斑	投与条件	同時
理由・原因	全身麻酔薬には、アナフィラキシー作用、ヒスタミン遊離作用を有するものがあり、本剤にもヒスタミン遊離作用がある	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.