

商品名 イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」 医薬品基本情報

薬効	6123 アミノ糖系抗生物質製剤	一般名	イセパマイシン硫酸塩注射液
英名	Isepamicin sulfate	剤型	注射液
薬価	873.00	規格	400mg 2mL 1管
メーカー	日医工	毒劇区分	

イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」の効能・効果

敗血症、(外傷、熱傷、手術創)の二次感染、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、腎盂腎炎、腹膜炎、膀胱炎

イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 腎機能障害、大量投与、長期間投与	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. 腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
4. アミノグリコシド系抗生物質による難聴の家族歴、難聴の家族歴、アミノグリコシド系抗生物質による難聴、難聴、重症筋無力症、経口摂取の不良、全身状態の悪い、非経口栄養、腎機能障害、肝機能障害、クエン酸で抗凝固処理した血液を大量輸血された	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」の副作用等

1. ショック、チアノーゼ、呼吸困難、胸内苦悶、血圧低下	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 急性腎障害、重篤な腎障害、眩暈、耳鳴、難聴、第8脳神経障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満

3. 過敏症、蕁麻疹、ビタミンK欠乏症状、低プロトロンビン血症、出血傾向、ビタミンB群欠乏症状、舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎、発赤、潰瘍	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 発疹、腎機能障害、BUN上昇、クレアチニン上昇、尿所見異常、乏尿、肝機能障害、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、LDH上昇、血清ビリルビン上昇、貧血、白血球減少、血小板減少、好酸球増多	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. そう痒、発熱、浮腫、血尿、カリウム異常、電解質異常、四肢しびれ感、しびれ感、脱力感、血小板増多、下痢、悪心、嘔吐、食欲不振、疼痛、硬結、倦怠感、ほてり、頭痛、悪寒	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
6. 眩暈、耳鳴、難聴、第8脳神経障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 急性腎障害、重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 第8脳神経障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. ビタミンK欠乏症状、第8脳神経障害、新生仔外有毛細胞消失、腎障害、出血傾向、聴覚障害、前庭障害、神経筋遮断症状、呼吸麻痺、硬結	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」の相互作用

- 薬剤名等：腎障害を起こすおそれのある血液代用剤

発現事象	腎障害が発現・悪化	投与条件	-
理由・原因	近位尿細管上皮の空胞変性、アミノグリコシド系抗生物質の血中濃度の上昇	指示	希望禁止

- 薬剤名等：ループ利尿剤

発現事象	腎障害及び聴器障害が発現・悪化	投与条件	-
理由・原因	アミノグリコシド系抗生物質の血中濃度の上昇、腎への蓄積	指示	希望禁止

- 薬剤名等：腎毒性及び聴器毒性を有する薬剤

発現事象	腎障害及び聴器障害が発現・悪化	投与条件	-
理由・原因	両薬剤ともに腎毒性、聴器毒性を有する	指示	希望禁止

- 薬剤名等：麻酔剤

発現事象	呼吸抑制	投与条件	-
理由・原因	両薬剤ともに神経筋遮断作用を有しており、併用によりその作用が 増強	指示	注意

5. 薬剤名等：筋弛緩剤

発現事象	呼吸抑制	投与条件	-
理由・原因	両薬剤ともに神経筋遮断作用を有しており、併用によりその作用が 増強	指示	注意

6. 薬剤名等：筋弛緩作用を有する薬剤

発現事象	呼吸抑制	投与条件	-
理由・原因	両薬剤ともに神経筋遮断作用を有しており、併用によりその作用が 増強	指示	注意

7. 薬剤名等：腎毒性を有する薬剤

発現事象	腎障害が発現・悪化	投与条件	-
理由・原因	両薬剤ともに腎毒性を有する	指示	注意

8. 薬剤名等：クエン酸で抗凝固処理した血液を大量輸血された

発現事象	呼吸麻痺、神経筋遮断症状	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」の配合変化

1. 薬剤名等：アンピシリン

発現事象	アミドを形成し本剤の活性低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

2. 薬剤名等：セフォチアム

発現事象	アミドを形成し本剤の活性低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

3. 薬剤名等：セフロキシム

発現事象	アミドを形成し本剤の活性低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止


4. 薬剤名等：アスコルビン酸注射液

発現事象 本剤の活性低下

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.