

## 商品名 ラリキシンドライシロップ小児用20% 医薬品基本情報

薬効	6132 セフェム系抗生物質製剤	一般名	セファレキシシンシロップ用
英名	Larixin	剤型	シロップ用
薬価	38.10	規格	200mg 1g
メーカー	富士フィルム富山化学	毒劇区分	

### ラリキシンドライシロップ小児用20%の効能・効果

慢性膿皮症、リンパ管炎、リンパ節炎、深在性皮膚感染症、表在性皮膚感染症、(外傷、熱傷、手術創)の二次感染、咽頭炎、急性気管支炎、喉頭炎、肺炎、扁桃炎、慢性呼吸器病変の二次感染、腎盂腎炎、膀胱炎、麦粒腫、涙嚢炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、顎炎、歯周組織炎、(口腔手術創、抜歯創)の二次感染、猩紅熱

### ラリキシンドライシロップ小児用20%の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 類薬で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 類薬で過敏症の既往歴、アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起し易い体質、気管支喘息を起し易い体質、蕁麻疹を起し易い体質、発疹を起し易い体質、経口摂取の不良、全身状態の悪い、非経口栄養、高度腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

### ラリキシンドライシロップ小児用20%の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、呼吸困難、全身潮紅、浮腫、急性腎障害、重篤な腎障害、溶血性貧血、偽膜性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、発熱、咳嗽、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎、PIE症候群	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
2. 過敏症、発疹、蕁麻疹、紅斑、そう痒、発熱、リンパ腺腫脹、関節痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

3. 悪心、嘔吐、下痢、軟便、腹痛、食欲不振、胃不快感

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

4. 顆粒球減少、好酸球増多、血小板減少、黄疸、AST上昇、ALT上昇、Al-P  
上昇、菌交代症、口内炎、カンジダ症、ビタミンK欠乏症状、低プロトロンビン血  
症、出血傾向、ビタミンB群欠乏症状、舌炎、食欲不振、神経炎、頭痛、めまい、  
全身倦怠感

記載場所 その他の副作用

頻度 0.1%未満

5. 急性腎障害、重篤な腎障害

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

6. ショック、ビタミンK欠乏症状

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』