

商品名 セファクロル細粒小児用10%「JG」 医薬品基本情報

薬効	6132 セフェム系抗生物質製剤	一般名	セファクロル細粒
英名	Cefaclor JG	剤型	細粒
薬価	45.00	規格	100mg 1g
メーカー	長生堂製薬	毒劇区分	

セファクロル細粒小児用10%「JG」の効能・効果

慢性膿皮症、リンパ管炎、リンパ節炎、深在性皮膚感染症、表在性皮膚感染症、(外傷、熱傷、手術創)の二次感染、乳腺炎、咽頭炎、急性気管支炎、喉頭炎、肺炎、扁桃炎、慢性呼吸器病変の二次感染、腎盂腎炎、膀胱炎、麦粒腫、中耳炎、顎炎、歯冠周囲炎、歯周組織炎、猩紅熱

セファクロル細粒小児用10%「JG」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 類薬で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 類薬で過敏症の既往歴、アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起し易い体質、気管支喘息を起し易い体質、蕁麻疹を起し易い体質、発疹を起し易い体質、経口摂取の不良、全身状態の悪い、非経口栄養、高度腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

セファクロル細粒小児用10%「JG」の副作用等

1. 急性腎障害、重篤な腎障害、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎、PIE症候群、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいAl-P上昇、肝機能障害、黄疸、溶血性貧血	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. ショック、アナフィラキシー、呼吸困難、喘鳴、全身潮紅、浮腫、偽膜性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満

3. 過敏症、リンパ腺腫脹、関節痛、黄疸、菌交代症、口内炎、カンジダ症、ビタミンK欠乏症状、低プロトロンビン血症、出血傾向、ビタミンB群欠乏症状、舌炎、食欲不振、神経炎	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>その他の副作用</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>頻度不明</td></tr> </table>	記載場所	その他の副作用	頻度	頻度不明
記載場所	その他の副作用				
頻度	頻度不明				
4. 発疹、AST上昇、ALT上昇、悪心、下痢、腹痛	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>その他の副作用</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>5%未満</td></tr> </table>	記載場所	その他の副作用	頻度	5%未満
記載場所	その他の副作用				
頻度	5%未満				
5. 蕁麻疹、紅斑、そう痒、発熱、顆粒球減少、貧血、赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、血小板減少、好酸球増多、Al-P上昇、BUN上昇、血清クレアチニン上昇、嘔吐、胃不快感、胸やけ、食欲不振、頭痛、めまい	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>その他の副作用</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>0.1%未満</td></tr> </table>	記載場所	その他の副作用	頻度	0.1%未満
記載場所	その他の副作用				
頻度	0.1%未満				
6. 急性腎障害、重篤な腎障害	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>使用上の注意</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>頻度不明</td></tr> </table>	記載場所	使用上の注意	頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意				
頻度	頻度不明				
7. ショック、ビタミンK欠乏症状	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>使用上の注意</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>頻度不明</td></tr> </table>	記載場所	使用上の注意	頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意				
頻度	頻度不明				

