

商品名 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーフ」 医薬品基本情報

薬効	6132 セフェム系抗生物質製剤	一般名	セフカペン ピボキシル塩酸塩100mg細粒
英名	Cefcapene pivoxil hydrochloride TOWA	剤型	細粒
薬価	74.40	規格	100mg 1g
メーカー	東和薬品	毒劇区分	

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーフ」の効能・効果

咽頭炎、急性気管支炎、喉頭炎、猩紅熱、腎盂腎炎、中耳炎、肺炎、副鼻腔炎、扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍、膀胱炎、慢性膿皮症、リンパ管炎、リンパ節炎、深在性皮膚感染症、表在性皮膚感染症、扁桃炎、慢性膿皮症、リンパ管炎、リンパ節炎、深在性皮膚感染症、表在性皮膚感染症、(外傷、熱傷、手術創)の二次感染、咽頭炎、急性気管支炎、喉頭炎、肛門周囲膿瘍、乳腺炎、肺炎、扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍、扁桃炎、慢性呼吸器病変の二次感染、外耳炎、顎炎、子宮内感染、歯冠周囲炎、子宮付属器炎、歯周組織炎、腎盂腎炎、胆管炎、胆嚢炎、中耳炎、尿道炎、麦粒腫、バルトリン腺炎、副鼻腔炎、膀胱炎、瞼板腺炎、涙嚢炎、子宮頸管炎

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーフ」の使用制限等

- 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、血清カルニチンが低下する先天性代謝異常の小児等
記載場所 使用上の注意
注意レベル **禁止**
- 類薬で過敏症の既往歴
記載場所 使用上の注意
注意レベル **原則禁止**
- 類薬で過敏症の既往歴、アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、気管支喘息を起こし易い体質、蕁麻疹を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、経口摂取の不良、全身状態の悪い、非経口栄養、高度腎障害、腎不全、成人のクレアチニンクリアランス40mL/min以下
記載場所 使用上の注意
注意レベル **注意**

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーフ」の副作用等

- 間質性肺炎、好酸球性肺炎、発熱、咳嗽、呼吸困難
記載場所 重大な副作用
頻度 頻度不明

<p>2. ショック、アナフィラキシー、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗、呼吸困難、血圧低下、急性腎障害、重篤な腎障害、無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血、偽膜性大腸炎、出血性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、紅皮症、剥脱性皮膚炎、劇症肝炎、重篤な肝炎、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、肝機能障害、黄疸、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、横紋筋融解症、低カルニチン血症、低血糖、血清カルニチン低下、痙攣、意識障害、低血糖症状</p>	<p>記載場所 重大な副作用</p> <p>頻度 頻度不明</p>
<p>3. 過敏症、発疹、蕁麻疹、そう痒感、発赤、紅斑、腫脹、発熱、関節痛、顆粒球減少、貧血、赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、血小板減少、LDH上昇、Al-P上昇、γ-GTP上昇、黄疸、BUN上昇、蛋白尿、血尿、クレアチニン上昇、浮腫、腹痛、胃不快感、胃痛、嘔気、嘔吐、食欲不振、便秘、口渇、口内しびれ感、菌交代症、口内炎、カンジダ症、ビタミンK欠乏症状、低プロトロンビン血症、出血傾向、ビタミンB群欠乏症状、舌炎、神経炎、めまい、頭痛、アルドラーゼ上昇、倦怠感、眠気、心悸亢進、四肢しびれ感、筋肉痛</p>	<p>記載場所 その他の副作用</p> <p>頻度 頻度不明</p>
<p>4. 好酸球増多、ALT上昇、AST上昇、下痢、CK上昇</p>	<p>記載場所 その他の副作用</p> <p>頻度 5%未満</p>
<p>5. 急性腎障害、重篤な腎障害</p>	<p>記載場所 使用上の注意</p> <p>頻度 頻度不明</p>
<p>6. 無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血</p>	<p>記載場所 使用上の注意</p> <p>頻度 頻度不明</p>
<p>7. 劇症肝炎、重篤な肝炎、肝機能障害、黄疸</p>	<p>記載場所 使用上の注意</p> <p>頻度 頻度不明</p>
<p>8. ショック、ビタミンK欠乏症状、低カルニチン血症、低血糖、出血傾向、CK上昇、筋細胞障害</p>	<p>記載場所 使用上の注意</p> <p>頻度 頻度不明</p>



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』