

商品名 セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「TW」 医薬品基本情報

薬効	6132 セフェム系抗生物質製剤	一般名	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠
英名	Cefcapene pivoxil hydrochloride TW	剤型	錠
薬価	36.30	規格	75mg 1錠
メーカー	東和薬品	毒劇区分	

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「TW」の効能・効果

慢性膿皮症、リンパ管炎、リンパ節炎、深在性皮膚感染症、表在性皮膚感染症、(外傷、熱傷、手術創)の二次感染、咽頭炎、急性気管支炎、喉頭炎、肛門周囲膿瘍、乳腺炎、肺炎、扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍、扁桃炎、慢性呼吸器病変の二次感染、外耳炎、顎炎、子宮内感染、歯冠周囲炎、子宮付属器炎、歯周組織炎、腎盂腎炎、胆管炎、胆嚢炎、中耳炎、尿道炎、麦粒腫、バルトリン腺炎、副鼻腔炎、膀胱炎、顎板腺炎、涙嚢炎、子宮頸管炎

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「TW」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、血清カルニチンが低下する先天性代謝異常の小児等	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 類薬で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 類薬で過敏症の既往歴、アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、気管支喘息を起こし易い体質、蕁麻疹を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、経口摂取の不良、全身状態の悪い、非経口栄養、高度腎障害、腎不全、クレアチニンクリアランス40mL/min以下	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「TW」の副作用等

1. 間質性肺炎、好酸球性肺炎、発熱、咳嗽、呼吸困難	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

2. ショック、アナフィラキシー、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗、呼吸困難、血圧低下、急性腎障害、重篤な腎障害、無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血、偽膜性大腸炎、出血性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、紅皮症、剥脱性皮膚炎、劇症肝炎、重篤な肝炎、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、肝機能障害、黄疸、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、横紋筋融解症	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 過敏症、関節痛、発熱、顆粒球減少、血小板減少、黄疸、浮腫、菌交代症、口内炎、カンジダ症、ビタミンK欠乏症状、低プロトロンビン血症、出血傾向、ビタミンB群欠乏症状、舌炎、食欲不振、神経炎、心悸亢進、四肢しびれ感、筋肉痛、血清カルニチン低下	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 発疹、好酸球増多、ALT上昇、AST上昇、LDH上昇、Al-P上昇、γ-GTP上昇、BUN上昇、蛋白尿、血尿、下痢、腹痛、胃不快感、胃痛、嘔気、嘔吐、CK上昇、アルドラーゼ上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. 蕁麻疹、そう痒感、発赤、紅斑、腫脹、貧血、赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、クレアチニン上昇、食欲不振、便秘、口渇、口内しびれ感、めまい、頭痛、倦怠感、眠気	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
6. 急性腎障害、重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 劇症肝炎、重篤な肝炎、肝機能障害、黄疸	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. ショック、ビタミンK欠乏症状、低カルニチン血症、低血糖、出血傾向、血清カルニチン低下、CK上昇、筋細胞障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

