

商品名 セフトジジム静注用1g「サワイ」 医薬品基本情報

薬効	6132 セフェム系抗生物質製剤	一般名	セフトジジム1g静注用
英名	Ceftazidime	剤型	静注用
薬価	444.00	規格	1g 1瓶
メーカー	沢井製薬	毒劇区分	

セフトジジム静注用1g「サワイ」の効能・効果

感染性心内膜炎、敗血症、(外傷、熱傷、手術創)の二次感染、咽頭炎、急性気管支炎、喉頭炎、膿胸、肺炎、肺膿瘍、扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍、扁桃炎、慢性呼吸器病変の二次感染、化膿性髄膜炎、肝膿瘍、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合組織炎、腎盂腎炎、胆管炎、胆嚢炎、中耳炎、パルトリン腺炎、副鼻腔炎、腹膜炎、膀胱炎、前立腺炎＜急性症＞、前立腺炎＜慢性症＞

セフトジジム静注用1g「サワイ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 腎機能障害	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
4. 類薬で過敏症の既往歴、アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起し易い体質、気管支喘息を起し易い体質、蕁麻疹を起し易い体質、発疹を起し易い体質、経口摂取の不良、全身状態の悪い、非経口栄養、高度腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

セフトジジム静注用1g「サワイ」の副作用等

1. 急性腎障害、重篤な腎障害、溶血性貧血、偽膜性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎、PIE症候群、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいγ-GTP上昇、急性肝炎、肝機能障害、黄疸、脳症、昏睡、意識障害、痙攣、振戦、ミオクロヌス、精神・神経症状	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

2.	ショック、アナフィラキシー、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗、気管支痙攣、呼吸困難、顔面潮紅、血管性浮腫、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少	記載場所	重大な副作用
		頻度	0.1%未満
3.	リンパ球増多、ビタミンK欠乏症状、低プロトロンビン血症、出血傾向、ビタミンB群欠乏症状、舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎、しびれ	記載場所	その他の副作用
		頻度	頻度不明
4.	過敏症、発疹、発熱、顆粒球減少、好酸球増多、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇、BUN上昇、下痢	記載場所	その他の副作用
		頻度	5%未満
5.	蕁麻疹、紅斑、そう痒、貧血、血小板増多、黄疸、ビリルビン上昇、クレアチニン上昇、悪心、嘔吐、腹痛、食欲不振、菌交代症、口内炎、カンジダ症、めまい、頭痛、味覚障害、口渇感	記載場所	その他の副作用
		頻度	0.1%未満
6.	ビタミンK欠乏症状、出血傾向、痙攣、意識障害、精神・神経症状、血管痛、血栓性静脈炎	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明

セフトジジム静注用1g「サワイ」の相互作用

- 薬剤名等：利尿剤

発現事象	腎障害が増強	投与条件	-
理由・原因	フロセミド投与による利尿のためレニン－アンジオテンシン系の賦活又は利尿剤による脱水等で尿細管細胞へのセフェム系抗生物質の取り込みが亢進し、腎毒性を発揮	指示	注意

- 薬剤名等：経口避妊薬

発現事象	効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	腸内細菌叢を変化させ、経口避妊薬の腸肝循環による再吸収を抑制	指示	注意

セフトジジム静注用1g「サワイ」の配合変化

- 薬剤名等：バンコマイシン塩酸塩注射剤

発現事象	白濁、沈殿	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

- 薬剤名等：ガベキサートメシル酸塩注射剤

発現事象	白濁、沈殿	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

- 薬剤名等：ブロムヘキシン塩酸塩注射剤

発現事象	白濁、沈殿	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

4. 薬剤名等：ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射剤

発現事象	白濁、沈殿	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

5. 薬剤名等：カンレノ酸カリウム注射剤

発現事象	白濁、沈殿	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

6. 薬剤名等：ジピリダモール注射剤

発現事象	白濁、沈殿	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

7. 薬剤名等：炭酸水素ナトリウム注射液

発現事象	本剤の安定性が低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

8. 薬剤名等：フルオロウラシル注射剤

発現事象	時間の経過とともに本剤の力価が低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

9. 薬剤名等：テガフル注射剤

発現事象	時間の経過とともに本剤の力価が低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

10. 薬剤名等：アミノフィリン水和物注射剤

発現事象	時間の経過とともに本剤の力価が低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』