

## 商品名 セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」 医薬品基本情報

薬効	6132 セフェム系抗生物質製剤	一般名	セフトリアキソンナトリウム水和物静注用
英名	Ceftriaxone sodium	剤型	静注用
薬価	359.00	規格	500mg 1瓶
メーカー	日医工	毒劇区分	

### セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」の効能・効果

咽頭炎、急性気管支炎、喉頭炎、膿胸、肺炎、敗血症、肺膿瘍、扁桃炎、慢性呼吸器病変の二次感染、顎炎、角膜潰瘍、顎骨周辺の蜂巣炎、化膿性髄膜炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、腎盂腎炎、胆管炎、胆嚢炎、中耳炎、直腸炎、尿道炎、バルトリン腺炎、副睾丸炎、副鼻腔炎、腹膜炎、膀胱炎、精巣上体炎、腹腔内膿瘍、骨盤内炎症性疾患、子宮頸管炎、角膜炎

### セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、高ビリルビン血症の新生児、高ビリルビン血症の低出生体重児	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 高度腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 高度腎障害	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
4. 類薬で過敏症の既往歴、アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、気管支喘息を起こし易い体質、蕁麻疹を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、経口摂取の不良、全身状態の悪い、非経口栄養、高度腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

### セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」の副作用等

1. 胆石、胆嚢内沈殿物、胆嚢炎、胆管炎、膵炎、腹痛	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

2. ショック、アナフィラキシー、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗、呼吸困難、顔面浮腫、汎血球減少、無顆粒球症、白血球減少、血小板減少、溶血性貧血、劇症肝炎、重篤な肝炎、AST上昇、ALT上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、肝機能障害、黄疸、急性腎障害、間質性腎炎、偽膜性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、発熱、咳嗽、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎、肺好酸球増多症、PIE症候群、腎結石、尿路結石、尿量減少、排尿障害、血尿、結晶尿、腎後性急性腎不全、精神神経症状、意識障害、意識消失、意識レベル低下、痙攣、不随意運動、舞蹈病アテトーゼ、ミオクロヌス	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 好塩基球増多、軟便、菌交代症、口内炎、カンジダ症、ビタミンK欠乏症状、低プロトロンビン血症、出血傾向、ビタミンB群欠乏症状、舌炎、食欲不振、神経炎、注射部位反応、注射部位紅斑、注射部位疼痛、注射部位腫脹	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 過敏症、発疹、蕁麻疹、発熱、そう痒、好酸球増多、顆粒球減少、貧血、血小板増多、下痢、嘔気、嘔吐、腹痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. 発赤、紅斑、異常プロトロンビン、食欲不振、頭痛、浮腫、心室性期外収縮	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
6. 汎血球減少、無顆粒球症、白血球減少、血小板減少、溶血性貧血	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 劇症肝炎、重篤な肝炎、AST上昇、ALT上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、肝機能障害、黄疸	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 急性腎障害、間質性腎炎	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 死亡、ビタミンK欠乏症状、核黄疸、出血傾向、血管痛、血栓性静脈炎、ほてり感、嘔気、嘔吐	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

## セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」の相互作用

1. 薬剤名等：カルシウムを含有する注射剤		投与条件	同時
発現事象	死亡	指示	禁止
理由・原因	本剤とカルシウムを含有する注射剤又は輸液を同一経路から同時に投与した場合に、肺、腎臓等に生じたセフトリアキソンを成分とする結晶		
2. 薬剤名等：カルシウムを含有する輸液			

発現事象	死亡	投与条件	同時
理由・原因	本剤とカルシウムを含有する注射剤又は輸液を同一経路から同時に投与した場合に、肺、腎臓等に生じたセフトリアキソンを成分とする結晶	指示	禁止

3. 薬剤名等：利尿剤

発現事象	類似化合物<他のセフェム系抗生物質>で併用による腎障害増強作用	投与条件	-
理由・原因	利尿時の脱水による血中濃度の上昇	指示	注意

## セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」の配合変化

1. 薬剤名等：トブラマイシン

発現事象	混濁	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

2. 薬剤名等：ベカナマイシン硫酸塩

発現事象	混濁	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

3. 薬剤名等：ジベカシン硫酸塩

発現事象	混濁	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

4. 薬剤名等：カルシウムを含有する注射剤

発現事象	混濁	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

5. 薬剤名等：カルシウムを含有する輸液

発現事象	混濁	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

6. 薬剤名等：グルタチオン製剤

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

7. 薬剤名等：高濃度アミノ酸類の補液

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.