

商品名 チエナム点滴静注用キット0.5g 医薬品基本情報

薬効	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	一般名	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウムキット（1）
英名	Tienam	剤型	キット類
薬価	1238.00	規格	500mg 1キット（生理食塩液100mL 付）
メーカー	M S D	毒劇区分	

チエナム点滴静注用キット0.5gの効能・効果

感染性心内膜炎、敗血症、(外傷、熱傷、手術創)の二次感染、関節炎、急性気管支炎、骨髓炎、膿胸、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、角膜潰瘍、肝膿瘍、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、腎盂腎炎、全眼球炎、胆管炎、胆嚢炎、バルトリン腺炎、腹膜炎、膀胱炎、前立腺炎＜急性症＞、前立腺炎＜慢性症＞、角膜炎、眼内炎

チエナム点滴静注用キット0.5gの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、バルプロ酸ナトリウム投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 類薬で過敏症の既往歴、アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、気管支喘息を起こし易い体質、蕁麻疹を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、経口摂取の不良、全身状態の悪い、非経口栄養、てんかんの既往、中枢神経系障害、循環器系機能障害、心臓機能障害、腎機能障害、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

チエナム点滴静注用キット0.5gの副作用等

1. 呼吸停止、意識喪失、呼吸抑制、錯乱、不穏、中枢神経症状、ショック、アナフィラキシー、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗、呼吸困難、全身潮紅、浮腫、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens－Johnson症候群、劇症肝炎、肝炎、肝不全、重篤な肝障害、発熱、咳嗽、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎、PIE症候群、無顆粒球症、溶血性貧血、重篤な血液障害、急性腎障害、尿崩症、重篤な腎障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

2. 痙攣	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. 意識障害、黄疸、喘息発作、気管支痙攣、汎血球減少症、骨髄抑制、偽膜性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢、血栓性静脈炎	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
4. 乏尿、血尿、血中アミラーゼ上昇、舌変色、幻覚、譫妄、激越、ジスキネジア	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 過敏症、発疹、そう痒、発熱、顆粒球減少、好酸球増多、好塩基球増多、リンパ球増多、血小板減少、血小板増多、赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、Al-P上昇、γ-GTP上昇、尿ウロビリノーゲン上昇、BUN上昇、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、食欲不振	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. 蕁麻疹、潮紅、紅斑、血清クレアチニン上昇、頻尿、しびれ感、振戦、菌交代症、口内炎、カンジダ症、ビタミンK欠乏症状、低プロトロンビン血症、出血傾向、ビタミンB群欠乏症状、舌炎、食欲不振、神経炎、頭痛、倦怠感、浮腫、胸痛、味覚異常、疼痛、硬結、血清ナトリウム低下、血清カリウム上昇、血清カリウム低下	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
7. 重篤な肝障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 重篤な血液障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
10. ビタミンK欠乏症状、痙攣、呼吸停止、意識障害、呼吸抑制、中枢神経症状、出血傾向、BUN上昇、クレアチニン上昇、腎近位尿細管上皮細胞壊死、腎障害、胚損失増加	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

チエナム点滴静注用キット0.5gの相互作用

1. 薬剤名等：バルプロ酸ナトリウム		投与条件	-
発現事象	血中濃度が低下してんかんの発作が再発		
理由・原因	-	指示	禁止
2. 薬剤名等：ガンシクロビル		投与条件	-
発現事象	痙攣		
理由・原因	-	指示	注意


3. 薬剤名等：ファロペネムナトリウム

発現事象 血中濃度が上昇

投与条件 -

理由・原因 シラスタチンにより代謝酵素（DHP-1）が阻害

指示 注意



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.