

商品名 ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」 医薬品基本情報

薬効	6179 その他の主としてカビに作用するもの	一般名	ミカファンギンナトリウム注射用
英名	Micafungin sodium	剤型	注射用
薬価	2532.00	規格	75mg 1瓶
メーカー	ニプロ	毒劇区分	(劇)

ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」の効能・効果

呼吸器真菌症、消化管真菌症、真菌血症、造血幹細胞移植の(カンジダ症、アスペルギルス症)の予防

ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 類薬で過敏症の既往歴、薬物過敏症<本剤の成分に対する過敏症を除く>の既往、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」の副作用等

1. 血液障害、白血球減少、溶血性貧血、血管内溶血、血小板減少、溶血、ショック、アナフィラキシー、血圧低下、口内異常感、呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇、肝機能障害、黄疸、急性腎障害、重篤な腎障害、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 好中球減少	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. ALT上昇	記載場所	その他の副作用
4. 代謝異常、低カルシウム血症、低マグネシウム血症、悪心、嘔吐、クレアチニンクリアランス低下、CK上昇、ミオグロビン上昇、発熱、注射部位反応、注射部位腫脹、注射部位疼痛、注射部位紅斑	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

5. AST上昇、Al-P上昇、LDH上昇、γ-GTP上昇、カリウム上昇、カリウム低下、好酸球増多、発疹、高血圧、動悸、下痢、軟便、BUN上昇、クレアチニン上昇、静脈炎、関節炎、血管痛、悪寒、頭痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. 白血球減少、好中球減少、溶血性貧血、血管内溶血、血小板減少	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 肝機能障害、黄疸	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 急性腎障害、重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 肝機能障害、血漿中濃度低下、AST上昇、ALT上昇、単細胞壊死、肝障害像、肝変異細胞増加、肝細胞腫瘍、尿量増加、尿中Na増加、尿中Cl増加、精細管萎縮、精巣上体中精子数減少、精細管上皮空胞化、セルトリ細胞空胞化、精巣上体頭部管上皮の空胞化	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」の相互作用

1. 薬剤名等：シロリムス	発現事象	AUCが21%上昇	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	注意
2. 薬剤名等：イトラコナゾール	発現事象	クリプトコックス・ネオフォルマンسに対する作用を減弱	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	注意

ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」の配合変化

1. 薬剤名等：バンコマイシン塩酸塩	発現事象	配合直後に濁り	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	禁止
2. 薬剤名等：アルベカシン硫酸塩	発現事象	配合直後に濁り	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	禁止
3. 薬剤名等：ゲンタマイシン硫酸塩				

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

4. 薬剤名等 : トブラマイシン

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

5. 薬剤名等 : ジベカシン硫酸塩

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

6. 薬剤名等 : ミノサイクリン塩酸塩

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

7. 薬剤名等 : シプロフロキサシン

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

8. 薬剤名等 : パズフロキサシンメシル酸塩

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

9. 薬剤名等 : シメチジン

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

10. 薬剤名等 : ドブタミン塩酸塩

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

11. 薬剤名等 : ドキサプラム塩酸塩水和物

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

12. 薬剤名等 : ペンタゾシン

発現事象	配合直後に濁り
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

13. 薬剤名等 : ナファモスタットメシル酸塩

発現事象	配合直後に濁り	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

14. 薬剤名等：ガベキサートメシル酸塩

発現事象	配合直後に濁り	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

15. 薬剤名等：チアミンジスルフィド・ピリドキシン塩酸塩・ヒドロキシコバラミン酢酸塩

発現事象	配合直後に濁り	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

16. 薬剤名等：メナテトレノン

発現事象	配合直後に濁り	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

17. 薬剤名等：乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン

発現事象	配合直後に濁り	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

18. 薬剤名等：ドキソルビシン塩酸塩

発現事象	配合直後に濁り	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

19. 薬剤名等：アンピシリンナトリウム

発現事象	配合直後に力価低下	投与条件	-
理由・原因	本剤は塩基性溶液中で不安定	指示	禁止

20. 薬剤名等：スルファメトキサゾール・トリメトプリム

発現事象	配合直後に力価低下	投与条件	-
理由・原因	本剤は塩基性溶液中で不安定	指示	禁止

21. 薬剤名等：アシクロビル

発現事象	配合直後に力価低下	投与条件	-
理由・原因	本剤は塩基性溶液中で不安定	指示	禁止

22. 薬剤名等：ガンシクロビル

発現事象	配合直後に力価低下	投与条件	-
理由・原因	本剤は塩基性溶液中で不安定	指示	禁止


23. 薬剤名等：アセタゾラミドナトリウム

発現事象 配合直後に力価低下

投与条件 -

理由・原因 本剤は塩基性溶液中で不安定

指示 禁止



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.