

商品名 シベクトロ錠200mg 医薬品基本情報

薬効	6249 その他の合成抗菌剤	一般名	テジゾリドリン酸エステル錠
英名	Sivextro	剤型	錠
薬価	17556.60	規格	200mg 1錠
メーカー	M S D	毒劇区分	

シベクトロ錠200mgの効能・効果

慢性膿皮症、深在性皮膚感染症、(外傷、潰瘍、熱傷、手術創、びらん)の二次感染

シベクトロ錠200mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

2. 好中球減少症、好中球数1000/mm³未満

記載場所	使用上の注意
注意レベル	注意

シベクトロ錠200mgの副作用等

1. 腹痛、頻回の下痢、偽膜性大腸炎、貧血、白血球減少、汎血球減少、血小板減少、骨髄抑制、乳酸アシドーシス、代謝性アシドーシス、視神経症

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

2. 過敏症、薬物過敏症、尿臭異常、徐脈、潮紅、ほてり、リンパ節症、白血球減少、悪心、嘔吐、腹痛、便秘、腹部不快感、口内乾燥、消化不良、上腹部痛、鼓腸、胃食道逆流性疾患、血便排泄、味覚異常、霧視、硝子体浮遊物、不眠症、睡眠障害、不安、悪夢、頭痛、浮動性めまい、傾眠、振戦、錯感覚、感覚鈍麻、末梢性ニューロパチー、関節痛、筋痙縮、背部痛、頸部痛、皮膚そう痒症、全身性そう痒症、アレルギー性皮膚そう痒症、発疹、全身性発疹、紅斑性発疹、斑状丘疹状発疹、蕁麻疹、多汗症、脱毛症、ざ瘡、脱水、コントロール不良の糖尿病、高カリウム血症、咳嗽、鼻乾燥、肺うっ血、真菌感染、外陰腔真菌感染、皮膚真菌感染、カンジダ症、外陰腔カンジダ症、口腔カンジダ症、膿瘍、気道感染、疲労、悪寒、易刺激性、末梢性浮腫、握力低下

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

3. ALT上昇、AST上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇、肝機能異常、貧血、下痢、四肢不快感、そう痒性皮疹、発熱

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

4. 肋軟骨異常、肋軟骨癒合、肋骨骨格変異、椎骨骨格変異、胃腸管形態学的変化、胃腸管限局性びらん、胃腸管単細胞壊死、骨髓形態学的変化、骨髓低細胞性、精巣形態学的変化、精細管変性、脾臓B細胞減少、脾臓T細胞減少、血清IgG減少、胃腸管炎症、胃腸管粘膜萎縮、胃腸管潰瘍

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

シベクトロ錠200mgの相互作用

1. 薬剤名等：BCRPの基質である薬剤

発現事象 血中濃度等に影響

理由・原因 テジゾリドリン酸エステルを経口投与したとき、腸管のBCRPを阻害

投与条件 -

指示 注意

2. 薬剤名等：ロスバスタチン

発現事象 血中濃度が上昇

理由・原因 腸管のBCRPが阻害

投与条件 -

指示 注意

3. 薬剤名等：BCRPの基質となる薬剤

発現事象 血中濃度が上昇

理由・原因 腸管のBCRPが阻害

投与条件 -

指示 注意

