

## 商品名 テルビナフィン錠125mg「ニプロ」 医薬品基本情報

薬効	6290 その他の化学療法剤	一般名	テルビナフィン塩酸塩125mg錠
英名	Terbinafine	剤型	錠
薬価	31.50	規格	125mg 1錠
メーカー	ニプロ	毒劇区分	

### テルビナフィン錠125mg「ニプロ」の効能・効果

深在性皮膚真菌症、スポロトリコーシス、クロモミコーシス、白癬性肉芽腫、表在性皮膚真菌症、頭部白癬、ケルスス禿瘡、白癬性毛瘡、硬毛部急性深在性白癬、生毛部急性深在性白癬、生毛部白癬、爪白癬、手・足白癬<角質増殖型>、手・足白癬<趾間型>、爪カンジダ症

### テルビナフィン錠125mg「ニプロ」の使用制限等

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1. 重篤な肝障害、血液障害、血小板減少、汎血球減少、無顆粒球症、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴        | 記載場所  | 使用上の注意 |
|  | 注意レベル | 禁止     |
| 2. 腎機能障害、活動性肝疾患<重篤な肝障害を除く>、肝疾患<重篤な肝障害を除く>、慢性肝疾患<重篤な肝障害を除く> | 記載場所  | 使用上の注意 |
|  | 注意レベル | 注意     |

### テルビナフィン錠125mg「ニプロ」の副作用等

- |   |      |        |
|---|------|--------|
| 1. 汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、咽頭炎、発熱、リンパ節腫脹、紫斑、皮下出血、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、急性全身性発疹性膿疱症、紅皮症、剥脱性皮膚炎、横紋筋融解症、筋肉痛、脱力感、CK上昇、CPK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、ショック、アナフィラキシー、呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹、薬剤性過敏症症候群、発疹、肝機能障害、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現、遅発性の重篤な過敏症状、ヒトヘルペスウイルス6再活性化、HHV-6再活性化、ウイルス再活性化、亜急性皮膚エリテマトーデス | 記載場所 | 重大な副作用 |
|   | 頻度   | 頻度不明   |
| 2. 重篤な肝障害、肝不全、肝炎、胆汁うっ滞、黄疸、発疹、皮膚そう痒感、発熱、悪心、嘔吐、食欲不振、けん怠感  | 記載場所 | 重大な副作用 |
|   | 頻度   | 0.1%未満 |

3. 過敏症、乾癬様発疹、血清病様反応、関節痛、腭炎、錯感覚、感覚鈍麻、不安、抑うつ、嗅覚異常、聴覚障害、聴力低下、霧視、視力低下、乾癬、血管炎、インフルエンザ様疾患、体重減少	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 発疹、蕁麻疹、そう痒感、紅斑、 $\gamma$ -GTP上昇、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、ALP上昇、白血球減少、貧血、胃部不快感、腹痛、悪心、下痢、胃部膨満感、食欲不振、口渇、めまい、ふらつき、頭痛、眠気、BUN上昇、味覚異常、味覚消失、トリグリセライド上昇、総コレステロール上昇、疲労感、けん怠感	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. 光線過敏性反応、顔面浮腫、リンパ節腫脹、多形紅斑、水疱性皮膚炎、筋肉痛、嘔吐、舌炎、注意力低下、不眠、しびれ、頻尿、耳鳴、動悸、浮腫、月経異常、脱毛、発熱、CK上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
6. 重篤な肝障害、肝不全、肝炎、胆汁うっ滞、黄疸、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、死亡	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 重篤な肝障害、肝不全、肝炎、胆汁うっ滞、黄疸、死亡	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 母獣摂餌量減少、母獣体重増加抑制、悪心、腹痛、めまい	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
10. 網膜上に黄白色点	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

## テルビナフィン錠125mg「ニプロ」の相互作用

### 1. 薬剤名等：シメチジン

**発現事象** 本剤の血中濃度が上昇

**理由・原因** これらの薬剤によるチトクロームP450の抑制により本剤の代謝が遅延

**投与条件** -

**指示** 注意

### 2. 薬剤名等：フルコナゾール

**発現事象** 本剤の血中濃度が上昇

**理由・原因** これらの薬剤によるチトクロームP450の抑制により本剤の代謝が遅延

**投与条件** -

**指示** 注意

### 3. 薬剤名等：リファンピシン

発現事象	本剤の血中濃度が低下	投与条件	-
理由・原因	リファンピシンによる肝代謝酵素の誘導により、本剤の代謝が促進	指示	注意

4. 薬剤名等：三環系抗うつ剤

発現事象	血中濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	本剤のCYP2D6の阻害により、これらの薬剤又はその活性代謝物の代謝が遅延	指示	注意

5. 薬剤名等：マプロチリン

発現事象	血中濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	本剤のCYP2D6の阻害により、これらの薬剤又はその活性代謝物の代謝が遅延	指示	注意

6. 薬剤名等：デキストロメトルファン

発現事象	血中濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	本剤のCYP2D6の阻害により、これらの薬剤又はその活性代謝物の代謝が遅延	指示	注意

7. 薬剤名等：黄体・卵胞ホルモン混合製剤

発現事象	月経異常	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

8. 薬剤名等：シクロスポリン

発現事象	血中濃度が低下、移植患者では拒絶反応	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』