

商品名 ロタリックス内用液 医薬品基本情報

薬効	6313 ウイルスワクチン類	一般名	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン
英名	Rotarix	剤型	液
薬価	0.00	規格	1.5mL 1本
メーカー	G S K	毒劇区分	(劇)

ロタリックス内用液の効能・効果

ロタウイルスによる胃腸炎の予防

ロタリックス内用液の使用制限等

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1. 発熱、重篤な急性疾患、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、メッケル憩室、腸重積症発症を高める可能性のある未治療先天性消化管障害、腸重積症の既往、重症複合型免疫不全、SCID、予防接種を行うことが不適当な状態 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 禁止 |
| 2. 胃腸障害を有する乳児、感染原因を問わない感染性胃腸炎を有する乳児、重度胃腸疾患を有する乳児、慢性胃腸疾患を有する乳児 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 相対禁止 |
| 3. 先天性免疫不全症の家族歴、免疫機能に異常がある疾患又はその恐れ・疑い、免疫抑制をきたす治療中 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 慎重投与 |
| 4. 肝臓疾患、血液疾患、心臓血管系疾患、腎臓疾患、発育障害、全身性発疹の既往、予防接種で接種後2日以内に発熱の既往、アレルギー又はその恐れ・疑い、けいれんの既往、先天性免疫不全症の家族歴、免疫機能に異常がある疾患又はその恐れ・疑い、免疫抑制をきたす治療中、腎機能障害、肝機能障害、重度急性発熱性疾患、嘔吐、下痢 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 注意 |

ロタリックス内用液の副作用等

- | | | |
|-------------|------|---------|
| 1. アナフィラキシー | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 2. 易刺激性 | 記載場所 | その他の副作用 |

3. 鼓腸、腹痛、腸重積症、胃腸炎、皮膚炎

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

4. 発熱、下痢、食欲不振、嘔吐、血便排泄、咳嗽、鼻漏

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

5. 腸重積症

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ロタリックス内用液の配合変化

1. 薬剤名等：他の薬剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』