商品名　シングリックス筋注用 医薬品基本情報

薬効	6313 ウイルスワクチン類	一般名	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャイニーズハムスター卵巣細胞由来）
英名	Shingrix	剤型	注射用
薬価	0.00	規格	50μg1瓶（溶解液付）
メーカー	ＧＳＫ	毒劇区分	(劇)

シングリックス筋注用の効能・効果

帯状疱疹の予防

シングリックス筋注用の使用制限等

1. 発熱、重篤な急性疾患、本剤成分又は含有成分でアナフィラキシーの既往歴、予防接種を行うことが不適当な状態

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

2. 高度にリンパ球減少又はその恐れ・疑い、高度にリンパ球抑制又はその恐れ・疑い、化学療法実施後、化学療法実施予定、造血幹細胞移植実施後、造血幹細胞移植実施予定

記載場所	用法・用量
注意レベル	注意

3. 肝臓疾患、血液疾患、心臓血管系疾患、腎臓疾患、全身性発疹の既往、予防接種で接種後2日以内に発熱の既往、アレルギー又はその恐れ・疑い、本剤成分又は含有成分でアレルギーの既往歴、痙攣の既往、先天性免疫不全症の家族歴、免疫不全の既往、凝固障害、血小板減少症、抗凝固療法施行中、腎機能障害、肝機能障害

記載場所	使用上の注意
注意レベル	注意

シングリックス筋注用の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、アナフィラキシー反応、過敏症状

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

2. 疼痛、発赤、腫脹、そう痒感、胃腸症状、悪心、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛、筋肉痛、疲労、悪寒、発熱、倦怠感

記載場所	その他の副作用

3. 過敏症、蕁麻疹、血管性浮腫、皮膚そう痒症、発疹、紅斑、多汗症、口腔咽頭痛、咳嗽、注射部位反応、炎症、硬結、関節痛、内出血、浮腫、不快感、熱感、浮動性めまい、不眠症、傾眠、嗜眠、四肢痛、背部痛、筋骨格痛、頚部痛、鼻咽頭炎、気道感染、インフルエンザ感染、口腔ヘルペス感染、単純ヘルペス感染、インフルエンザ様疾患、無力症、冷感、食欲減退、回転性めまい

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

4. 注射による心因性反応、血管迷走神経反射、失神、一過性局所反応、一過性注射部位発赤、一過性注射部位腫脹

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

シングリックス筋注用の相互作用

1. 薬剤名等 ： 抗凝固療法施行中

発現事象	筋肉内注射部位の出血	投与条件	-
理由・原因	筋肉内注射部位の出血	指示	注意

シングリックス筋注用の配合変化

1. 薬剤名等 ： ワクチン

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止

薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量
医薬品データベースの決定版 『 DIR 』
Drug Intelligence Reinforce

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.