

## 商品名 コンファクトF注射用500 医薬品基本情報

薬効	6343 血漿分画製剤	一般名	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
英名	Confact F	剤型	注射用
薬価	34938.00	規格	500単位1瓶（溶解液付）
メーカー	KMバイオロジクス	毒劇区分	

### コンファクトF注射用500の効能・効果

血液凝固第8因子欠乏の出血傾向の抑制、von Willebrand病の出血傾向の抑制

### コンファクトF注射用500の使用制限等

1. 血液型がO型でない、IgA欠損症、抗IgA抗体を保有、溶血性貧血、失血性貧血、免疫不全、免疫抑制状態

記載場所 使用上の注意

注意レベル **注意**

### コンファクトF注射用500の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

2. 過敏症、発熱、蕁麻疹、顔面潮紅、悪心、嘔吐、腹痛、倦怠感、違和感、頭痛、血管痛、溶血性貧血、血圧上昇、悪寒、腰痛、結膜充血

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

3. インヒビター発生

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

4. 肝炎ウイルス感染、ウイルス感染、血管内凝固による栓塞、インヒビター発生、溶血性貧血、過敏反応、発熱、急激な貧血、重篤な全身症状、持続性貧血、胎児への障害、流産、胎児水腫、胎児死亡、チアノーゼ、動悸

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

### コンファクトF注射用500の配合変化

1. 薬剤名等：他の製剤

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件 -

指示 禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.