

商品名 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL 医薬品基本情報

薬効	6343 血漿分画製剤	一般名	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液
英名	Venoglobulin IH	剤型	注射液
薬価	20669.00	規格	2.5g 25mL 1瓶
メーカー	日本血液製剤機構	毒劇区分	

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mLの効能・効果

低ガンマグロブリン血症、無ガンマグロブリン血症、重症感染症、特発性血小板減少性紫斑病、川崎病の急性期、(多発性筋炎、皮膚筋炎)の筋力低下の改善、(多巣性運動ニューロパチー、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎)の筋力低下の改善、(多巣性運動ニューロパチー、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎)の運動機能低下の進行抑制、全身型重症筋無力症、天疱瘡、(インフルエンザ菌を起炎菌とする急性気管支炎、インフルエンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎、インフルエンザ菌を起炎菌とする肺炎、肺炎球菌を起炎菌とする急性気管支炎、肺炎球菌を起炎菌とする急性中耳炎、肺炎球菌を起炎菌とする肺炎)の血清IgG2値の低下の発症抑制、水疱性類天疱瘡、ギラン・バレー症候群、抗ドナー抗体陽性腎移植の術前脱感作、(腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植)の抗体関連型拒絶反応の治療

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mLの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分でショックの既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 疱疹状天疱瘡、腫瘍随伴性天疱瘡、薬剤誘発性天疱瘡	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意
4. 血液型がO型以外、IgA欠損症、抗IgA抗体を保有、脳血管障害又はその既往、心臓血管障害又はその既往、血栓塞栓症又はその恐れ・疑い、溶血性貧血、失血性貧血、免疫不全、免疫抑制状態、心機能低下、急性腎障害又はその恐れ・疑い、腎機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mLの副作用等

1. 血圧低下、ショック

記載場所	用法・用量
頻度	頻度不明

2. 黄疸、心不全、心不全悪化、呼吸困難、心雑音、心機能低下、浮腫、尿量減少

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

3. ショック、アナフィラキシー、呼吸困難、頻脈、喘鳴、喘息様症状、胸内苦悶、血圧低下、脈拍微弱、チアノーゼ、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいAl-P上昇、著しいγ-GTP上昇、著しいLDH上昇、肝機能障害、無菌性髄膜炎、項部硬直、発熱、頭痛、悪心、嘔吐、意識混濁、急性腎障害、腎機能検査値悪化、BUN値悪化、血清クレアチニン値悪化、尿量減少、血小板減少、肺水腫、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓症、深部静脈血栓症、血栓塞栓症、中枢神経症状、めまい、意識障害、四肢麻痺、胸痛、突然の呼吸困難、息切れ、下肢疼痛、下肢浮腫

記載場所	重大な副作用
頻度	5%未満

4. 肝機能検査値異常、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇

記載場所	その他の副作用
------	---------

5. 過敏症、全身発赤、水疱、痙攣、傾眠、意識障害、しびれ、不機嫌、徐脈、低酸素血症、溶血性貧血、四肢痛、関節痛、低ナトリウム血症

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

6. 発疹、汗疱、蕁麻疹、顔面潮紅、局所性浮腫、そう痒感、頭痛、振戦、不穏、顔色不良、血圧上昇、四肢冷感、咳嗽、喘息様症状、口腔咽頭不快感、悪心、嘔吐、下痢、腹痛、白血球減少、好中球減少、好酸球増多、フィブリンDダイマー増加、静脈炎、血管痛、注射部位反応、注射部位腫脹、注射部位紅斑、発熱、悪寒、戦慄、倦怠感、CK上昇、体温低下、背部痛、頸部痛、ほてり

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

7. 溶血性貧血、急性腎障害、水分負荷、過敏反応、脳梗塞、心筋梗塞、血栓塞栓症、発熱、急激な貧血、重篤な全身症状、持続性貧血、心不全、心不全悪化、胎児への障害、流産、胎児水腫、胎児死亡、ショック、AST上昇、ALT上昇、肝機能障害、皮膚潰瘍、皮膚壊死

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mLの相互作用

1. 薬剤名等：非経口用生ワクチン

発現事象	効果が得られない	投与条件	慢性炎症性脱髄性多発根神経炎、特発性血小板減少性紫斑病、ITP、川崎病、ギラン・バレー症候群、多巣性運動ニューロパチー、MMN、CID、天疱瘡、水疱性類天疱瘡、多発性筋炎、皮膚筋炎、全身型重症筋無力症、腎移植術前脱感作、臓器移植における抗体関連型拒絶反応の治療
理由・原因	本剤の主成分は免疫抗体であるため、中和反応により生ワクチンの効果が減弱	指示	注意

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mLの配合変化

1. 薬剤名等：他剤

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』