

商品名 ベネフィクス静注用1000 医薬品基本情報

薬効	6343 血漿分画製剤	一般名	ノナコグアルファ（遺伝子組換え）注射用
英名	BeneFIX	剤型	注射用
薬価	73078.00	規格	1,000国際単位1瓶（溶解液付）
メーカー	ファイザー	毒劇区分	

ベネフィクス静注用1000の効能・効果

(血友病B、先天性血液凝固第9因子欠乏症)の出血傾向の抑制

ベネフィクス静注用1000の使用制限等

1. DIC、播種性血管内凝固症候群、術後、血栓塞栓性事象のリスク、線維素溶解の徴候、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	相対禁止
2. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ハムスターたん白質に対し過敏症の既往、類薬で過敏症の既往歴、血液凝固第9因子に対するインヒビターが発生、血液凝固第9因子に対するインヒビターを有しかつ血液凝固第9因子に過敏症の既往、重症疾患のある新生児	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ベネフィクス静注用1000の副作用等

1. 注射部位疼痛	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. ショック、アナフィラキシー、蕁麻疹、悪寒、血管浮腫、呼吸困難、血圧低下、頻脈、血栓症	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 霧視、嘔気、嘔吐、注射部位反応、注射部位疼痛、頭痛、浮動性めまい、味覚異常、振戦、呼吸困難、咳嗽、低酸素症、胸部不快感、発疹、蕁麻疹、蜂巣炎、潮紅、発熱、悪寒、静脈炎	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. インヒビター発生	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

5. アナフィラキシー、アレルギー反応、インヒビター発生、ネフローゼ症候群、血栓塞栓性事象、生命を脅かす上大静脈症候群

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ベネフィクス静注用1000の配合変化

1. 薬剤名等：他剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.