

## 商品名 ガストログラフィン経口・注腸用 医薬品基本情報

薬効	7211 ヨウ素化合物製剤	一般名	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液
英名	Gastrografin	剤型	液
薬価	19.50	規格	1mL
メーカー	バイエル薬品	毒劇区分	

### ガストログラフィン経口・注腸用の効能・効果

狭窄の疑いの消化管造影、急性出血の消化管造影、(消化器潰瘍、憩室)の穿孔の恐れ消化管造影、外科手術を要する急性症状時の消化管造影、(胃切除後、腸切除後)の(穿孔の危険、縫合不全)の消化管造影、内視鏡検査法実施前の(腫瘍、異物)の造影、(腸瘻孔、胃瘻孔)の造影、コンピューター断層撮影の上部消化管造影

### ガストログラフィン経口・注腸用の使用制限等

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ヨードに過敏症の既往   | 記載場所  | 使用上の注意 |
|   | 注意レベル | 禁止     |
| 2. アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、発疹の家族歴、じん麻疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、気管支喘息を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、じん麻疹を起こし易い体質、結腸炎、腸炎、電解質代謝異常、脱水症、誤嚥を引き起こす又はその恐れ・疑い、嚥下困難、意識レベル低下、術前 | 記載場所  | 使用上の注意 |
|   | 注意レベル | 注意     |

### ガストログラフィン経口・注腸用の副作用等

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| 1. ショック、意識消失、心停止、アナフィラキシー、呼吸困難                               | 記載場所 | 重大な副作用  |
|  | 頻度   | 頻度不明    |
| 2. 過敏症、そう痒感、じん麻疹、発疹、発赤、紅斑、血圧低下、下痢、悪心、嘔吐、腹痛、腹部不快感、甲状腺機能低下症、発熱 | 記載場所 | その他の副作用 |
|  | 頻度   | 頻度不明    |
| 3. 過敏反応、呼吸困難、肺水腫、脱水症状  | 記載場所 | 使用上の注意  |
|  | 頻度   | 頻度不明    |



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.