

商品名 バリエネマLC 医薬品基本情報

薬効	7212 バリウム塩製剤	一般名	硫酸バリウム注腸剤
英名	Barienema	剤型	注腸剤
薬価	1057.40	規格	30% 400mL 1個
メーカー	日医工	毒劇区分	

バリエネマLCの効能・効果

消化管<大腸>撮影

バリエネマLCの使用制限等

- 消化管穿孔又はその恐れ・疑い、消化管に急性出血、消化管閉塞又はその恐れ・疑い、類聚で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴
- 消化管瘻孔又はその恐れ・疑い、穿孔又はその恐れ・疑い、胃潰瘍、潰瘍性大腸炎、憩室炎、十二指腸潰瘍、腫瘍、虫垂炎、寄生虫感染、腸重積症、生体組織検査後間もない、消化管狭窄又はその恐れ・疑い、腸管憩室、アトピー性皮膚炎を起こし易い体質、喘息を起こし易い体質、過敏症反応を起こし易い体質、医薬品に対し過敏症の既往、心臓に基礎疾患

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

記載場所 使用上の注意

注意レベル 注意

バリエネマLCの副作用等

- ショック、アナフィラキシー、顔面蒼白、四肢冷感、血圧低下、チアノーゼ、意識消失、潮紅、蕁麻疹、顔面浮腫、喉頭浮腫、呼吸困難
- 腸閉塞、腹膜炎、大腸潰瘍、大腸炎、憩室炎、バリウム虫垂炎、消化管穿孔、腹痛
- 排便困難、便秘、一過性下痢、一過性腹痛、肛門部痛、肛門部出血、悪心、嘔吐、過敏症、発疹、そう痒感、蕁麻疹
- 腹痛、消化器症状

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

5. バリウム腹膜炎、出血部位穿孔、穿孔、消化管穿孔、腸閉塞、大腸潰瘍、大腸炎、憩室炎、バリウム虫垂炎、ショック、アナフィラキシー、不整脈、心電図異常、重篤な転帰、肉芽腫

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.