

商品名 イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 医薬品基本情報

薬効	7219 その他のX線造影剤	一般名	イオパミドールキット
英名	Iopamidol	剤型	キット類
薬価	4139.00	規格	61.24% 100mL 1筒
メーカー	富士製薬	毒劇区分	

イオパミドール300注シリンジ100mL「F」の効能・効果

大動脈撮影、脳血管撮影、四肢血管撮影、選択的血管撮影、デジタルX線撮影法の(動脈性血管撮影、静脈性血管撮影)、コンピュータ断層撮影の造影、逆行性尿路撮影、静脈性尿路撮影

イオパミドール300注シリンジ100mL「F」の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ヨードに過敏症の既往、重篤な甲状腺疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 一般状態の極度に悪い、気管支喘息、重篤な心障害、マクログロブリン血症、多発性骨髄腫、多発性骨髄腫で脱水症状、テタニー、褐色細胞腫又はその恐れ・疑い、パラガングリオーマ又はその恐れ・疑い、重篤な腎障害、無尿、重篤な肝障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. アレルギーの家族歴、発疹の家族歴、じん麻疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、じん麻疹を起こし易い体質、薬物過敏症の既往、脱水症状、高血圧症、動脈硬化、糖尿病、甲状腺疾患<重篤な甲状腺疾患を除く>、急性膵炎、腎機能低下、肝機能低下	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

イオパミドール300注シリンジ100mL「F」の副作用等

1. ショックを伴わない意識障害、失神	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. ショック、遅発性ショック、失神、意識消失、呼吸困難、呼吸停止、心停止、咽頭浮腫、喉頭浮腫、顔面浮腫、アナフィラキシー、遅発性アナフィラキシー、腎不全、急性腎障害、急性呼吸窮迫症候群、肺水腫、急速に進行する呼吸困難、低酸素血症、両側性びまん性肺浸潤影、胸部X線異常、血小板減少、痙攣発作、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸、心室細動、冠動脈攣縮、皮膚障害、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、急性汎発性発疹性膿疱症、発熱、紅斑、小膿疱、そう痒感、眼充血、口内炎、アレルギー反応に伴う急性冠症候群、せん妄、錯乱、健忘症、麻痺、造影剤脳症、意識障害、失語、皮質盲、中枢神経症状	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

3. 過敏症、潮紅、チアノーゼ、動悸、不整脈、虚脱、徐脈、くしゃみ、咽頭不快感、喘息発作、頻呼吸、喉頭不快感、嘔声、鼻閉、鼻汁、あくび、不安感、振戦、一過性盲、視力障害、意識レベル低下、錯感覚、ピリピリ感、発汗、口内にかみ感、口腔内不快感、唾液増加、下痢、耳下腺腫大、甲状腺機能低下症、胸内苦悶感、悪寒、冷感、倦怠感、異常感、結膜充血、流涙、疼痛、背部痛、四肢痛、関節痛
4. 発疹、そう痒感、じん麻疹、血圧上昇、頻脈、血圧低下、顔面蒼白、咳、閃光感、頭痛、めまい、羞明感、しびれ、しびれ感、口渇、悪心、嘔吐、腹痛、熱感、発熱
5. ショック、重篤な副作用、過敏反応、重篤な遅発性副作用、遅発性ショック、腎機能低下、血液のゼラチン様変化、死亡、腎不全、無尿、血圧上昇、頻脈、不整脈、急性腎障害、血管痛、血栓性静脈炎、発赤、腫脹、水疱

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明
記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満
記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

イオパミドール300注シリンジ100mL「F」の相互作用

1. 薬剤名等： ビグアナイド系糖尿病用剤

発現事象 乳酸アシドーシス

投与条件 -

理由・原因 ビグアナイド系糖尿病用剤の腎排泄が減少し、血中濃度が上昇

指示 注意

イオパミドール300注シリンジ100mL「F」の配合変化

1. 薬剤名等： 他の薬剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止

