

商品名 イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」 医薬品基本情報

薬効	7219 その他のX線造影剤	一般名	イオパミドールキット
英名	Iopamidol HK	剤型	キット類
薬価	2888.00	規格	61.24% 50mL 1筒
メーカー	光製薬	毒劇区分	

イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」の効能・効果

大動脈撮影、脳血管撮影、四肢血管撮影、選択的血管撮影、デジタルX線撮影法の(動脈性血管撮影、静脈性血管撮影)、コンピュータ断層撮影の造影、逆行性尿路撮影、静脈性尿路撮影

イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ヨードに過敏症の既往、重篤な甲状腺疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 一般状態の極度に悪い、気管支喘息、重篤な心障害、マクログロブリン血症、多発性骨髄腫、多発性骨髄腫で脱水症状、テタニー、褐色細胞腫又はその恐れ・疑い、パラガングリオーマ又はその恐れ・疑い、重篤な腎障害、無尿、重篤な肝障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. アレルギーの家族歴、発疹の家族歴、じん麻疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、じん麻疹を起こし易い体質、薬物過敏症の既往、脱水症状、高血圧症、動脈硬化、糖尿病、甲状腺疾患<重篤な甲状腺疾患を除く>、急性膵炎、腎機能低下、肝機能低下	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」の副作用等

1. ショックを伴わない意識障害、失神	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. ショック、遅発性ショック、失神、意識消失、呼吸困難、呼吸停止、心停止、咽頭浮腫、喉頭浮腫、顔面浮腫、アナフィラキシー、遅発性アナフィラキシー、腎不全、急性腎障害、急性呼吸窮迫症候群、肺水腫、急速に進行する呼吸困難、低酸素血症、両側性びまん性肺浸潤影、胸部X線異常、血小板減少、痙攣発作、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸、心室細動、冠動脈攣縮、皮膚障害、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、急性汎発性発疹性膿疱症、発熱、紅斑、小膿疱、そう痒感、眼充血、口内炎、アレルギー反応に伴う急性冠症候群、せん妄、錯乱、健忘症、麻痺、造影剤脳症、意識障害、失語、皮質盲、中枢神経症状	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

3. 過敏症、潮紅、チアノーゼ、動悸、不整脈、虚脱、徐脈、咽頭不快感、喘息発作、頻呼吸、喉頭不快感、嘔声、鼻閉、鼻汁、あくび、不安感、振戦、一過性盲、視力障害、意識レベル低下、錯感覚、ピリピリ感、発汗、口内にかみ感、口腔内不快感、唾液増加、下痢、耳下腺腫大、甲状腺機能低下症、胸内苦悶感、悪寒、冷感、倦怠感、異常感、結膜充血、流涙、疼痛、背部痛、四肢痛、関節痛
4. 発疹、そう痒感、じん麻疹、血圧上昇、頻脈、血圧低下、顔面蒼白、咳、くしゃみ、閃光感、頭痛、めまい、羞明感、しびれ、しびれ感、口渇、悪心、嘔吐、腹痛、熱感、発熱
5. ショック、重篤な副作用、過敏反応、重篤な遅発性副作用、遅発性ショック、腎機能低下、血液のゼラチン様変化、死亡、腎不全、無尿、血圧上昇、頻脈、不整脈、急性腎障害、血管痛、血栓性静脈炎、発赤、腫脹、水疱

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」の相互作用

1. 薬剤名等：ビグアナイド系糖尿病用剤

発現事象 乳酸アシドーシス

投与条件 -

理由・原因 ビグアナイド系糖尿病用剤の腎排泄が減少し、血中濃度が上昇

指示 注意

イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」の配合変化

1. 薬剤名等：他の薬剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』