

商品名 イオメロン300注50mL 医薬品基本情報

薬効	7219 その他のX線造影剤	一般名	イオメプロール注射液
英名	Iomeron	剤型	注射液
薬価	2069.00	規格	61.24% 50mL 1瓶
メーカー	ブラッコ・ジャパン	毒劇区分	

イオメロン300注50mLの効能・効果

脳血管撮影、胸部血管撮影、腹部血管撮影、四肢血管撮影、デジタルX線撮影法の(動脈性血管撮影、静脈性血管撮影)、コンピュータ断層撮影の造影、静脈性尿路撮影

イオメロン300注50mLの使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ヨードに過敏症の既往、重篤な甲状腺疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 一般状態の極度に悪い、気管支喘息、重篤な心障害、マクログロブリン血症、多発性骨髄腫、テタニー、褐色細胞腫又はその恐れ・疑い、パラガングリオーマ又はその恐れ・疑い、重篤な腎障害、重篤な肝障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、発疹の家族歴、じん麻疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、気管支喘息を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、じん麻疹を起こし易い体質、薬物過敏症の既往、脱水症状、高血圧症、動脈硬化、糖尿病、甲状腺疾患<重篤な甲状腺疾患を除く>、急性膵炎、重症筋無力症、中枢神経系障害、腎機能低下、肝機能低下	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

イオメロン300注50mLの副作用等

1. ショックを伴わない意識障害、失神	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. ショック、遅発性ショック、失神、意識消失、呼吸困難、呼吸停止、心停止、咽頭浮腫、喉頭浮腫、アナフィラキシー、遅発性アナフィラキシー、アレルギー反応に伴う急性冠症候群、肺水腫、急性呼吸窮迫症候群、心室細動、冠動脈攣縮、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸、脳血管障害、脳循環不全、脳虚血、痙攣発作、腎不全、血小板減少、皮膚障害、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、急性汎発性発疹性膿疱症、発熱、紅斑、小膿疱、そう痒感、眼充血、口内炎、麻痺、造影剤脳症、意識障害、失語、皮質盲、中枢神経症状	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

3. 急性腎障害

記載場所	重大な副作用
頻度	0.1%未満

4. 過敏症、発赤、膨疹、ふらふら感、眠気、傾眠、不安、不穏、脱力、健忘、言語障害、一過性盲、視力障害、腹痛、食欲不振、唾液増加、口腔内不快感、口内炎、頻脈、不整脈、心不全、顔面蒼白、チアノーゼ、喘鳴、嘔声、咽喉頭不快感、甲状腺機能低下症、BUN増加、血清クレアチニン増加、無尿、浮腫、しびれ感、血管痛、しゃっくり、結膜炎、流涙、眼異常

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

5. 発疹、そう痒、じん麻疹、頭痛、めまい感、悪心、嘔吐、血圧低下、血圧上昇、くしゃみ、顔面潮紅、血中カリウム増加、胸痛、倦怠感、悪寒、味覚異常、嗅覚異常

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

6. 振戦、羞明、失語症、口渇、下痢、ST低下、徐脈、期外収縮、動悸、呼吸困難、鼻炎、咳嗽、背部痛、発熱、熱感、多汗

記載場所	その他の副作用
頻度	0.1%未満

7. ショック、重篤な副作用、過敏反応、重篤な遅発性副作用、遅発性ショック、腎機能低下、血液のゲル状変化、死亡、尿細管閉塞、血圧上昇、頻脈、不整脈、心肺停止、脳血管障害、痙攣、血管痛、発赤、腫脹、水疱

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

イオメロン300注50mLの相互作用

1. 薬剤名等： ビグアナイド系糖尿病用剤

発現事象 ヨード造影剤で乳酸アシドーシス

投与条件 -

理由・原因 ビグアナイド系糖尿病用剤の腎排泄が減少し、血中濃度が上昇

指示 注意

イオメロン300注50mLの配合変化

1. 薬剤名等： 抗ヒスタミン剤

発現事象 配合変化

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止

2. 薬剤名等： 副腎皮質ホルモン剤

発現事象 配合変化

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.