

## 商品名 プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」 医薬品基本情報

薬効	7223 内分泌機能検査用試薬	一般名	プロチレリン酒石酸塩2mg1mL注射液
英名	Protirelin tartrate	剤型	注射液
薬価	1714.00	規格	2mg 1mL 1管
メーカー	日医工	毒劇区分	

### プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」の効能・効果

(頭部外傷、くも膜下出血)の昏睡・半昏睡を除く遷延性意識障害、脊髄小脳変性症の運動失調の改善

### プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」の使用制限等

1. 下垂体腺腫	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
2. 心障害、遺伝性果糖不耐症、下垂体腺腫、甲状腺ホルモン剤投与中、抗甲状腺剤投与中、副腎皮質ステロイド剤投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

### プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」の副作用等

1. ショック様症状、一過性血圧低下、意識喪失、痙攣、頭痛、視力障害、視野障害、下垂体卒中、血小板減少	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 悪心	記載場所	その他の副作用
3. 心窩部不快感、AST上昇、不安、脱力感、咽頭違和感、乳房腫大、乳汁分泌	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 脈拍数変動、熱感、顔面潮紅感、動悸、胸部圧迫感、血圧変動、嘔吐、食欲不振、腹痛、口渇、ALT上昇、白血球減少、興奮、多弁、頭痛、めまい、しびれ感、過敏症、発疹、そう痒、尿意、発熱、発汗、悪寒、倦怠感、浮腫	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. 異味感、Al-P上昇、貧血、振戦、不眠、排尿障害	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

6. 一過性血圧上昇、一過性脈拍数上昇、低血糖、肝不全、腎不全、一過性尿意、悪心、熱感

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

## プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」の相互作用

1. 薬剤名等：甲状腺ホルモン剤投与中

発現事象 TRHに対するTSH分泌反応が変化

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

2. 薬剤名等：抗甲状腺剤投与中

発現事象 TRHに対するTSH分泌反応が変化

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

3. 薬剤名等：副腎皮質ステロイド剤投与中

発現事象 TRHに対するTSH分泌反応が変化

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』