

商品名 オムニスキャン静注32%シリンジ20mL 医薬品基本情報

薬効	7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	一般名	ガドジアミド水和物キット
英名	Omniscan	剤型	キット類
薬価	6101.00	規格	32.3% 20mL 1筒
メーカー	GEヘルスケアファーマ	毒劇区分	

オムニスキャン静注32%シリンジ20mLの効能・効果

磁気共鳴コンピューター断層撮影の(躯幹部・四肢造影、脳・脊髄造影)

オムニスキャン静注32%シリンジ20mLの使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、重篤な腎障害、急性腎障害、eGFRが $30\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$ 未満の慢性腎障害、長期透析が行われている終末期腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 一般状態の極度に悪い、気管支喘息、重篤な肝障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. アレルギーを起こし易い体質、アレルギー性鼻炎を起こし易い体質、蕁麻疹を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、アレルギーの家族歴、アレルギー性鼻炎の家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、薬物過敏症の既往、痙攣を起こし易い体質、てんかんを起こし易い体質、痙攣又はその既往、てんかん又はその既往、腎機能低下又はその恐れ・疑い、腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
4. 重篤な腎障害	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
5. 腎機能低下又はその恐れ・疑い、重篤な腎障害、腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

オムニスキャン静注32%シリンジ20mLの副作用等

1. 臨床検査値異常	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明

2. ショック、意識消失、顔面蒼白、呼吸困難、咽頭浮腫、喉頭浮腫、顔面浮腫、アナフィラキシー、痙攣発作、腎性全身性線維症、Nephrogenic Systemic Fibrosis、NSF、皮膚そう痒、皮膚腫脹、皮膚硬化、関節硬直、筋力低下	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="1109 125 1244 179">記載場所</td> <td data-bbox="1244 125 1426 179">重大な副作用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1109 179 1244 264">頻度</td> <td data-bbox="1244 179 1426 264">頻度不明</td> </tr> </table>	記載場所	重大な副作用	頻度	頻度不明
記載場所	重大な副作用				
頻度	頻度不明				
3. 血圧低下、血圧上昇、動悸、頻脈、喘息	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="1109 297 1244 351">記載場所</td> <td data-bbox="1244 297 1426 351">その他の副作用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1109 351 1244 425">頻度</td> <td data-bbox="1244 351 1426 425">頻度不明</td> </tr> </table>	記載場所	その他の副作用	頻度	頻度不明
記載場所	その他の副作用				
頻度	頻度不明				
4. 悪心、肝機能障害、AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、Al-P上昇	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="1109 459 1244 512">記載場所</td> <td data-bbox="1244 459 1426 512">その他の副作用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1109 512 1244 575">頻度</td> <td data-bbox="1244 512 1426 575">5%未満</td> </tr> </table>	記載場所	その他の副作用	頻度	5%未満
記載場所	その他の副作用				
頻度	5%未満				
5. 過敏症、発赤、発疹、蕁麻疹、そう痒感、顔面潮紅、赤血球減少、白血球変動、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、血小板減少、咳嗽、くしゃみ、鼻閉、頭痛、眩暈、下痢、嘔吐、総ビリルビン上昇、気分不快感、発汗、温熱感、発熱、悪寒、冷汗、冷感、結膜充血、LDH上昇、カリウム値変動、クロル値上昇、血清鉄変動、尿蛋白増加、尿沈渣増加	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="1109 609 1244 663">記載場所</td> <td data-bbox="1244 609 1426 663">その他の副作用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1109 663 1244 725">頻度</td> <td data-bbox="1244 663 1426 725">0.1%未満</td> </tr> </table>	記載場所	その他の副作用	頻度	0.1%未満
記載場所	その他の副作用				
頻度	0.1%未満				
6. 重篤な副作用、腎性全身性線維症、ショック、アナフィラキシー、痙攣、遅発性副作用、発熱、発疹、悪心、血圧低下、呼吸困難、胎仔骨格異常、血管痛、血栓性静脈炎、発赤、腫脹、水疱	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="1109 813 1244 866">記載場所</td> <td data-bbox="1244 813 1426 866">使用上の注意</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1109 866 1244 929">頻度</td> <td data-bbox="1244 866 1426 929">頻度不明</td> </tr> </table>	記載場所	使用上の注意	頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意				
頻度	頻度不明				



Drug
Intelligence
Reinforce

薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』